

Chemie.

**Stereochemische und strukturechemische
Untersuchungen
in der Haematoxylinreihe.**

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

genehmigt

von der philosophischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn.

Von

Heinz Ulrich Werner

aus Heidenheim/Brenz.

B o n n 1936

Berichterſtatter:

Profeſſor Dr. phil. Dr. ing. E. h. Paul Pfeiffer.



Meinen lieben Eltern
in Dankbarkeit gewidmet!

Die vorliegende Arbeit wurde im Chemischen Institut der Universität Bonn auf Anregung von Herrn Professor Dr. Dr. ing. E. h. P. Pfeiffer ausgeführt.

Meinem hochverehrten Lehrer möchte an dieser Stelle für das mir stets erwiesene Wohlwollen und die mir bei der Ausführung dieser Arbeit in liebenswürdiger Weise gegebenen wertvollen und vielseitigen Anregungen meinen herzlichsten Dank aussprechen.

Inhaltsverzeichnis.

Allgemeiner Teil.

	Seite
I. Einführung einer einheitlichen Bezeichnungsweise in der Brasilin- und Haematoxylinreihe	11
II. Stereoisomerie bei Chromindan- und Naphtocumaran- derivaten	17
III. Synthetische Versuche in der Haematoxylinreihe	26
A. Synthese des Tetramethylhämatoxylons (1,2,10,11- Tetramethoxy-lyo-chromindandion-(5,6)	28
B. Reduktionsprodukte der Chromindanreihe (μ -Oxy- tetramethylhaematoxylin und seine Derivate)	23
1. μ -Oxytetramethylhaematoxylin (5,6-Oxy-1,2, 10,11-tetramethoxychromindan) und μ -Oxy- pentamethylhaematoxylin (5-Oxy-1,2,6,10,11- pentamethoxychromindan)	32
2. Salze des μ -Oxytetramethylhaematoxylins und des μ -Oxypentamethylhaematoxylins	40
3. Reduktionsversuche am μ -Oxytetramethylhae- matoxylin und μ -Oxypentamethylhaematoxylin	45
C. Reduktionsprodukte der Tetramethylisohaematoxy- lin-Reihe α - und β -Tetramethyl-isohaematoxylin	48
D. Reduktionsprodukte der Oxido-lyochromindan- Reihe. α - und β -Tetramethyl-allohaematoxylin	59

Praktischer Teil.

I. Darstellung des Tetramethylhaematoxylin und des Tetramethylhaematoxylons

1. Tetramethylhaematoxylin (5-Oxy, 1,2,10,11-Tetramethoxychromindan 67
2. Tetramethylhaematoxylon (1,2,10,11-Tetramethoxy-lyo-chromindandion-(5,6) 68

II. Reduktionsprodukte der μ -Oxytetramethylhaematoxylinreihe 68

1. Reduktion des Tetramethylhaematoxylons mit Zinkstaub und Eisessig 69
2. μ -Oxytetramethylhaematoxylin (5,6-Dioxy-1,2,10,11-tetramethoxychromindan 70
3. Konstitutionsermittlung am μ -Oxytetramethylhaematoxylin:
 - a) Oxydation zum Tetramethylhaematoxylon . 70
 - b) Acetonkondensationsprodukt von μ -Oxytetramethylhaematoxylin 71
 - c) Versuche zur Acetylierung und Benzoylierung von μ -Oxytetramethylhaematoxylin . 71
4. Salze des μ -Oxytetramethylhaematoxylins:
 - a) μ -Oxytetramethylhaematoxylin-chlorid . . . 72
 - b) μ -Oxytetramethylhaematoxylin-bromid . . . 73
 - c) μ -Oxytetramethylhaematoxylin-jodid 74
 - d) μ -Oxytetramethylhaematoxylin-sulfat 74
 - e) μ -Oxytetramethylhaematoxylin-perchlorat . . 75
 - f) Tetramethyliso-haemateinsulfat 75

5. Reduktionsversuche am μ -Oxytetramethylhaematoxylin.

- a) Reduktion zum Tetramethylanhydrohaematoxylin (1,2,10,11-Tetramethoxychrominden) . 76
- b) Reduktion zum Tetramethyldesoxyhaematoxylin (1,2,10,11-Tetramethoxychromindan) 78

	Seite
6. μ -Oxypentamethylhaematoxylin (5-Oxy- 1,2,6,10,11-Pentamethoxychrominda n	79
7. Oxydation des μ -Oxypentamethylhaematoxy- lins zum Tetramethylhaematoxylon	80
8. Salze des μ -Oxypentamethylhaematoxytins:	
a) μ -Oxypentamethylhaematoxylin-chlorid	80
b) μ -Oxypentamethylhaematoxylin-bromid	82
c) μ -Oxypentamethylhaematoxylin-perchlorat	85
d) Tetramethylisohaematein[sulfat (aus μ -Oxy- pentamethylhaematoxylin)	84
9. Reduktionsversuche am μ -Oxypentamethyl- haematoxylin:	
a) Reduktion zum Tetramethyldeoxyhaema- toxylin (1,2,10,11-Tetramethoxychrominda n)	84
b) Reduktion zum Tetramethylanhydrohaema- toxylin (1,2,10,11- Tetramethoxychrominda n)	58

III. Reduktionsprodukte der Tetramethylisohaematoxylin- Reihe.


1. Reduktion des Tetramethylhaematoxylons mit Magnesium und Eisessig	85
2. Tetramethylhaematoxylonol (1,2,10,11-Tetra- methoxy-lyo-chrominda n(6)-ol(5)	86
3. α -Tetramethylhaematoxylopinakon	87
4. α -Tetramethylisohaematoxylin.	
a) Darstellung und Eigenschaften	87
b) Bestimmung des aktiven Wasserstoffes	88
c) α -Tetramethyl-isohaematoxylinperchlorat	89
d) Oxydation mit Chromsäure. Tetramethyl- oxo-isohaematoxylin	89
e) Acetylierungsversuche	90
5. β -Tetramethyl-isohaematoxylin.	
a) Darstellung	91
b) Acetyl- β -tetramethyl-isohaematoxylin	92

	Seite
c) β -Tetramethyl-iso-haematoxylinperchlorat . . .	92
d) Versuch zur Umlagerung in die α -Form . . .	93
e) Oxydation mit Chromsäure.	
Tetramethyl-oxo-iso-haematoxylin	93
IV. Reduktionsprodukte der Tetramethyl-allo-haematoxylin-Reihe.	
1. β -Tetramethyl-allohaematoxylin (1,2,10,11-Tetramethoxy-(5,6)-oxido-lyochromindan.	
a) Darstellung	93
b) Konstitutionsermittlungsversuche	94
2. α -Tetramethyl-allohaematoxylin.	
a) Darstellung	96
b) Versuche zur Konstitutionsermittlung	97
c) Additionsverbindung mit Aethylalkohol . . .	98
d) Additionsverbindung mit Benzol	98
V. Zusammenstellung der Strukturisomeren des Tetramethyl-haematoxylins $C_{20}H_{22}O_6$	
Literaturverzeichnis	101

Allgemeiner Teil.


In dem Kernholz des Blauholzbaumes findet sich als färbendes Prinzip, wahrscheinlich in Form eines Glucosides, das Haematoxylin, $C_{16}H_{14}O_6$; es ist sehr nahe verwandt mit dem färbenden Prinzip des Rotholzes, dem Brasilin, $C_{16}H_{14}O_6$. Beide Verbindungen bilden bei vorsichtiger Oxydation an der Luft, unter Verlust zweier Wasserstoffatome, die eigentlichen Farbstoffe, das Haematein und Brasilein, die früher in Form ihrer Schwermetallacke wegen ihrer leuchtenden Farben Verwendung fanden, heute aber durch die viel echteren und billigeren Teerfarbenprodukte verdrängt sind.

Die Aufklärung der chemischen Konstitution beider Verbindungen, die seit langem in mühevoller und schwieriger Arbeit viele Forscher beschäftigt hatte, fand ihren zunächst vorläufigen Abschluß in der Aufstellung der Brasilinformel durch P. Pfeiffer¹⁾, mit der er die älteren Formeln von Feuerstein und Kostanecki²⁾, sowie von W. H. Perkin³⁾, verdrängte, da sie den bis dahin bekannten Abbaueversuchen am besten entsprach:



Brasilin-Formel nach:

P. Pfeiffer




Feuerstein und Kostanecki


1) Chem. Zeitschrift 3, 420 (1904).

2) B. 32, 1024 (1899).

3) Soc. 79, 1401 (1901).



Die schon von Liebermann und Burg¹⁾ ausgesprochene Vermutung, daß sich Brasilin und Haematoxylin zueinander verhalten wie Alizarin und Purpurin (d. h. Haematoxylin ist ein Monooxybrasilin), fand auf Grund vieler Analogiearbeiten in der Haematoxylinreihe ihre Bestätigung und führte, in Anlehnung an die Pfeiffersche Brasilinformel, einige Jahre später durch Perkin und Robinson²⁾ zur Aufstellung folgender Konstitutionsformel für das Haematoxylin³⁾:



¹⁾ B. 9, 1883 (1876).

²⁾ Soc. 93, 496 (1908).

³⁾ Die alten Konstitutionsformeln für das Haematoxylin entsprechen den oben angeführten, heute als unzutreffend erkannten Brasilinformeln.

Ziel und Aufgabe der vorliegenden Arbeit war nun zunächst die Fortführung der bisher von P. Pfeiffer und Mitarbeitern ¹⁾ veröffentlichten Untersuchungen in der Haematoxylin- und Brasilinreihe. Durch den systematischen Abbau der beiden Farbstoffe und die Synthese des größten Teils dieser Abbauprodukte können die Pfeiffer-Perkin'schen Formeln heute als endgültig bewiesen angesehen werden; die Untersuchungen durch eine Totalsynthese zu einem endgültigen Abschluß zu bringen, gelang aber bisher noch nicht. In der vorliegenden Arbeit gelang es nun, das μ -Oxytetramethylhaematoxylin zu synthetisieren, das sich vom tetramethylierten Haematoxylin nur durch ein Sauerstoffatom unterscheidet und mit ihm in etwa der gleichen Beziehung steht wie das Triphenylcarbinol zum Triphenylmethan. Die Reduktionsversuche führten jedoch bis jetzt zu keinem brauchbaren Resultat, da sie in einer ganz anderen Richtung als der gewünschten verliefen. Weiterhin wurden zwei Strukturisomere des Tetramethylhaematoxylins dargestellt, an denen, obwohl sie für die Synthese des Haematoxylins weniger von Bedeutung waren, durch eingehendere Untersuchungen die Kenntnisse des großen Gebietes der sich vom Haematoxylin ableitenden Verbindungen erweitert und vertieft werden konnten. Vor allem führten sie zu interessanten stereochemischen Problemen, die alle nach der heute gültigen Vorstellung über den räumlichen Bau organischer Verbindungen eine zwanglose Erklärung fanden und so einen kleinen Beitrag zu dem interessanten Gebiet der Stereochemie bilden.



I. Einführung einer einheitlichen Bezeichnungsweise in der Brasilin- und Haematoxylinreihe.

Da die Namengebung für die vielen, im Laufe der Untersuchungen in der Brasilin- und Haematoxylinreihe aufgefundenen Verbindungen sehr oft zu nicht einheitlichen Bezeichnungsweisen führte, die damit eine klare Zusammenfassung der einzelnen Verbindungsklassen sehr erschweren, erscheint es zweckmäßig, einige verhältnismäßig einfach gebaute Grundkörper einer neuen Bezeichnungsweise zugrunde zu legen, um auf sie alle bis jetzt bekannten Verbindungen der Brasilin- und Haematoxylinreihe zu beziehen.



1) Ein Verzeichnis der bis jetzt erschienenen Veröffentlichungen von P. Pfeiffer über die Brasilin- und Haematoxylinfrage befindet sich am Schluß der Arbeit.

Es sei vorweg betont, daß die Derivate des Brasileïns und Haemateïns, sowie die Vertreter der Neunringverbindungen und der sich davon ableitenden inneren Aether nur insoweit in die neue Bezeichnungsweise mit einbezogen worden sind, als an ihnen ebenfalls die neue Nummerierung des Kohlenstoffskeletts der Grundkörper durchgeführt wurde.


Wie man leicht sieht, kann man sich die Formeln des Brasilins und Haematoxylins aus zwei Grundkörpern aufgebaut denken, dem Chroman (I) und dem Indan (II):



die in 3,4 bzw. 1',2'-Stellung orthokondensiert aneinandergeschlossen sind. Man gelangt so zu einer vorläufig hypothetischen Substanz, dem Chromindan (III), die zusammen mit ihrem Dehydrierungsprodukt, dem Chrominden (IV), der Grundkörper für eine große Anzahl von Brasilin- und Haematoxylderivaten ist, die das gleiche Kohlenstoffskelett enthalten. Um nun die Abkömmlinge des Chromindans und Chromindens einheitlich und eindeutig benennen zu können, werden die für Substituenten in Betracht kommenden Stellen in folgender Weise von 1 bis 12 nummeriert:




Es vereinfachen sich so z. B. die genauen Bezeichnungen des Tetramethyldesoxyhaematoxylin (V) und des μ -Oxytetramethylhaematoxylin (VI) gegenüber der alten Bezeichnungsweise ganz erheblich:



(1, 2, 10, 11-Tetramethoxychromindan)

alte Definition:

7, 8, 5', 6'-Tetramethoxy, (indeno 2' 1': 3, 4-chromen)-dihydrid-(3, 4).




(5, 6-Dioxy, 1, 2, 10, 11-tetramethoxychromindan),


alte Definition:

3, 4-Dioxy-7, 8, 5', 6'-tetramethoxy-(indeno 2', 1': 3, 4-chromen) dihydrid-(3, 4).

Für die Vertreter der Brafilein- und Haemateinreihe ergibt sich daraus ebenfalls eine neue Bezeichnung, da sie ja in engem Zusammenhang mit den Chromindanderivaten stehen. Der Grundkörper dieser Reihe ist das **Chinochromindan** (VII), an dem die Benennung der C-Atome wie bei den Chromindanen selbst durchgeführt wird.




Die neue genaue Bezeichnungsweise für das Haematein (VIII) wäre demnach:




(6-Oxy, 1, 2, 11-trioxychinochromindan).

Auch die Neunringderivate (Tetramethylhaematoxylon ufw.), die den Chromindanen sehr nahe stehen, sollen in die neue Bezeich-

nungsweise miteinbezogen werden. Ihnen liegt als Grundkörper das **Lyochromindan** (IX) zugrunde¹⁾:




das sich vom Chromindan dadurch unterscheidet, daß in ihm die Verknüpfung der Kohlenstoffatome 5 und 6 gelöst ist. Tetramethylhaematoxylon (X) wird dann folgendermaßen bezeichnet:



(1, 2, 10, 11-Tetramethoxy-lyo-chromindandion-(5, 6).


während das Tetramethyl-allohaematoxylon (XI) als innerer Aether folgenden Namen erhält:

1) von λνωζ = lösen,




(1, 2, 10, 11-Tetramethoxy-(5, 6)-oxido-lyochromindan),


In ähnlicher Weise wird für eine weitere Körperklasse, die in sehr engem Zusammenhang mit den Braflin- und Haematoxylin-abkömmlingen steht, eine einheitliche Nomenklatur eingeführt. Es handelt sich um Verbindungen, die sich von den Chromindanen dadurch unterscheiden, daß statt der Verknüpfung der Kohlenstoffatome 5 und 6 eine solche zwischen 5 und 7 besteht; man kann sie sich dadurch aufgebaut denken, daß man an ein teilweise hydriertes Naphthalinmolekül (XIi) einen Cumarinring (XIII) in 3, 4 bzw. 2', 3'-Stellung anschließt, wodurch man zu einem Grundkörper kommt, der den Namen *N a p h t o c u m a r a n* (XIV) führt:



XIII



XIV





Um den inneren Zusammenhang mit den Chromindanderivaten beizubehalten, wird die Bezifferung der Kohlenstoffatome wie oben durchgeführt.

Die neuen Bezeichnungsweisen sollen keineswegs die alten, eingebürgerten Trivialnamen, wie sie in der Literatur Eingang gefunden haben, verdrängen. Ihre Aufgabe soll nur sein, die innere Verwandtschaft der einzelnen Glieder der Brafilin- und Haematoxylinreihe auch in der Nomenklatur klar zum Ausdruck bringen zu können. Sie werden in der vorliegenden Arbeit den Trivialnamen in Klammern beigelegt.


II. Stereoisomerie bei Chromindan- und Naphtocumaranderivaten.

An den Strukturformeln des Chromindans (I) und Naphtocumarans (II), sowie ihren Derivaten kann man leicht erkennen, daß die von dem Chroman (Cumaran)-ring und dem Indan-(Naphthalin)-ring gebildeten Flächen nicht in einer Ebene liegen können:




sondern daß vielmehr zwei verschiedene Möglichkeiten ihrer Lage zueinander gegeben sind, die das Auftreten beider Verbindungen und ihrer Derivate in stereoisomeren Formen erwarten lassen.

Ähnliche stereochemische Verhältnisse bestehen z. B. nach A. v. B a y e r beim Hexahydrophthaläureanhydrid (III):




Sein Molekül wird von zwei Ringen, dem Cyklohexanring und einem daran orthokondensierten Fünfring gebildet. Die Theorie läßt hier zwei Formen als möglich erscheinen, wenn diese beiden Ringe nicht derselben Ebene angehören, sondern folgendermaßen gestellt sind.





Beide Formen, von denen sich die trans-Form als sehr labil erweist und schon durch Schmelzen in die cis-Form übergeführt werden kann, sind bekannt.

In neuerer Zeit hat H ü c k e l ähnliche stereochemische Isomeriefälle am Decahydro- β -naphthol, (Decalol), (IV) aufgefunden:





IV

Das Bestehen von vier isomeren Reduktionsprodukten des β -Naphthols, die alle vier bekannt sind, kann nur dann eine Erklärung finden, wenn man die beiden Sechsringe des Decalols als nicht in einer Ebene liegend betrachtet. Hückel hat sämtliche vier, von der Theorie geforderten isomeren Formen dargestellt, von denen er für je zwei die cis-, für die beiden anderen die trans-Konfiguration annimmt und ihren räumlichen Bau durch folgende Formeln zum Ausdruck bringt:




cis-Decalole




trans-Decalole

Diese Überlegungen lassen nun bei den Chromindan- und Naphtocumaranderivaten ebenfalls das Bestehen einer cis- und einer trans-Form erwarten, die folgenden Formelbildern entsprechen:

a) Chromindan:




cis-Form




trans-Form

b) Naphthocumaran:



cis-Form



trans-Form ,

indem nach dem oben Gefagten die beiden Ringe I und II nicht in einer Ebene liegen können; eine Forderung, die sich am Modell leicht konstruieren läßt.

Wie schon Herzig und Pollack¹⁾ durch Messungen an Triacetylbrasilin und Tetramethylhaematoxylin zeigten, drehen die beiden Verbindungen der Naturprodukte das polarisierte Licht nach rechts; diese Tatsache läßt sich sehr leicht mit der Pfeifferschen Formulierung erklären, da beide Verbindungen als Chromindanderivate zwei asymmetrische Kohlenstoffatome (5 und 6) besitzen, die strukturell verschieden sind und demnach 4 isomere, optisch aktive Formen erwarten lassen, von denen je 2 als Antipoden zu optisch inaktiven Racematen zusammentreten können.

Werden die beiden, strukturell verschiedenen asymmetrischen Kohlenstoffatome mit A und B bezeichnet, so können die Isomerie-


1) M. 15. 749 (1903).

möglichkeiten durch folgende Formeln zum Ausdruck gebracht werden:

aktive Formen:



inaktive, racemische Formen:





Die vor auszusehenden beiden inaktiven racemischen Formen 5 und 6 sind nun nach den Grundprinzipien der Stereochemie so zu deuten, daß der einen die cis-, der anderen die trans-Konfiguration zukommt.



Theoretisch sind also für das Haematoxylin und auch für das Brasilin 6 isomere Formen zu erwarten, und zwar 4 optisch aktive und 2 optisch inaktive racemische Formen. Bekannt sind bisher nur 1 optisch aktives Haematoxylin und ein optisch aktives Brasilin.


Da die in der vorliegenden Arbeit dargestellten Chromindan- und Naphtocumaranderivate durch Reduktion des optisch inaktiven Tetramethylhaematoxylons, (es enthält kein asymmetrisches C-Atom, gewonnen wurden und daher racemischer Natur sein müssen, so mußten sie nach den obigen theoretischen Überlegungen in je zwei stereoisomeren Formen auftreten, von denen die eine der cis-, die andere der trans-Reihe angehört. Es gelang nun, beim Tetramethyl-iso-haematoxylin die cis-trans-isomeren Formen zu fassen und beim μ -Oxytetramethylhaematoxylin nachzuweisen, daß die synthetisierte Verbindung der cis-Reihe angehört. Auch beim Tetramethyl-allohaematoxylin, einem Oxidodivat der Lyochromindan-Reihe, konnten die cis-trans-isomeren Formen isoliert werden.

Bei der Reduktion des Tetramethylhaematoxylons mit Magnesium in eisessigsaurer Lösung erhielten wir ein mit dem tetramethylierten Haematoxylin strukturisomeres Reduktionsprodukt, das Tetramethyl-iso-haematoxylin, für dessen Konstitution wir zwei mögliche Formeln annehmen können; je nachdem der Ringschluß im Neunerring erfolgt, liegt ein Chromindan (V)- bzw. Naphtocumaranderivat (VI) vor (siehe Seite 55).




Aus dem oben Gefagten ergibt sich, daß hier theoretisch zwei stereoisomere Formen, eine cis- und eine trans-Form zu erwarten sind. Tatsächlich gelang es uns, dieses Reduktionsprodukt in zwei isomeren Formen zu isolieren, die sich in ihren Eigenschaften so ähnlich sind, daß nur eine Verschiedenheit in ihrem räumlichen Bau diese Isomerie erklären kann; folgende Formelbilder bringen dies zum Ausdruck:






cis-Form



trans-Form


Die eine Form, die vorläufig α -Form genannt werden soll, schmilzt bei 196° und läßt sich unter der Einwirkung von P_2O_5 in die isomere β -Form vom Schmelzpunkt 163° umwandeln. Welcher der beiden Formen die cis- und welcher die trans-Konfiguration zuzuschreiben ist, läßt sich vorläufig noch nicht entscheiden, da beide sterische Möglichkeiten im Modell einen sehr stabilen Bau aufweisen.

Dagegen gelang es, an einem weiteren Reduktionsprodukt des Tetramethylhaematoxylons, dem μ -Oxytetramethylhaematoxylin (VII), das eindeutig der Klasse der Chromindane angehört, die cis-Konfiguration zu beweisen:




VII


Als Dioxykörper mit zwei freien alkoholischen Hydroxylgruppen bildet diese Verbindung mit Aceton ein Kondensationsprodukt von der Art eines Cykloacetals:



Diese Reaktion kann etwa in Parallele gesetzt werden mit der Fähigkeit der China Säure, ein Diacetonkondensationsprodukt zu bilden, was als Beweis für die cis-Lage der Hydroxylgruppenpaare dient. In der gleichen Weise läßt sich die Bildung eines cyclischen Acetals des μ -Oxytetramethylhaematoxylin nur dann verstehen, wenn die beiden alkoholischen Hydroxylgruppen sich in cis-Stellung zueinander befinden. Damit ergibt sich für die beiden theoretisch möglichen cis-trans-Formen des μ -Oxytetramethylhaematoxylin folgendes Bild:




cis-Form
(F : 194°)




trans-Form

Es gelang bisher nicht, die trans-Form zu erhalten, da die große Säureempfindlichkeit der Verbindung vom Schmelzpunkt 194° eine Umwandlung mit P_2O_5 nicht erlaubte.

Sehr interessant sind die isomeren Verhältnisse bei den Reduktionsprodukten des Trimethylbrafilons und Tetramethylhaematoxylin, die der Oxido-lyo-chromindanreihe angehören, dem Trimethyl-allobrafilin (VIII) und dem Tetramethyl-allohaematoxylin (IX):




VIII




IX

Im Grunde genommen kann man ihren räumlichen Bau dem der Chromindane und Naphtocumarane an die Seite stellen, da die beiden im Molekül enthaltenen Ringe, der heterocyklische Siebenring (I) und der sich daran anschließende Pyranring (II) aus sterischen Gründen nicht in derselben Ebene liegen können, wie sich ohne weiteres am Modell zeigen läßt. — Damit sieht die Theorie auch für die Oxido-lyo-chromindanreihe cis-trans-isomere Formen voraus, die sich durch folgende Formelbilder veranschaulichen lassen:



cis-Form



trans-Form

In schöner Übereinstimmung damit steht die Tatsache, daß beide bis jetzt bekannten Oxido-lyo-chromindanderivate, das Tri-

methyloallobrafilin und das Tetramethyloalohaematoxylin in zwei optisch inaktiven Formen dargestellt werden können, die als cis-trans-Isomere anzusehen sind.¹ Die eine Form des Trimethyloallobrafilins schmilzt bei 121° und wird vorläufig als β -Form bezeichnet; sie läßt sich leicht in die stabilere isomere α -Form vom Schmelzpunkt 135° umlagern.

In Analogie dazu soll in der Haematoxylinreihe die tiefer schmelzende Form des Tetramethyloalohaematoxylics (F. 150°) als die β -Form bezeichnet werden. Auch sie läßt sich leicht (unter der Einwirkung von P_2O_5) in die ihr isomere, stabilere α -Form vom Schmelzpunkt 166° umlagern.


Bis jetzt bestehen auch in dieser Reihe noch keinerlei Anhaltspunkte dafür, welche der stereoisomeren Formen der cis- und welche der trans-Reihe angehören. Das Modell läßt allerdings leicht erkennen, daß die trans-Formen wesentlich stabiler gebaut sind als die cis-Formen, woraus man vielleicht den Schluß ziehen darf, daß die stabileren, nicht umlagerungsfähigen α -Formen des Trimethyloallobrafilins und des Tetramethyloalohaematoxylics die trans-Konfiguration, die isomeren β -Formen die cis-Konfiguration besitzen.

III. Synthetische Versuche in der Haematoxylinreihe.

Als Ausgangsprodukt für die nun folgenden synthetischen Versuche diente das Tetramethylhaematoxylin (III), ein wichtiges Abbauprodukt des tetramethylierten natürlichen Haematoxylics (I), das nach der Vorschrift von Perkin²⁾ aus dem Naturprodukt durch Methylierung zum Haematoxylin-tetramethyläther (II) und nachfolgender Oxydation mit Chromsäure dargestellt wurde:

1) Diese Vermutung wurde schon von P. Pfeiffer in seinen Untersuchungen über die Konstitution des Trimethyloallobrafilins ausgesprochen. Journ. 140 9 f. (934).

2) Soc. 81, 1059 (1902).




In neuerer Zeit gelang es nun P. Pfeiffer und Mitarbeitern, das Tetramethylhaematoxylon synthetisch aufzubauen und damit die Konstitution dieses wichtigen Abbauproduktes sicherzustellen. Da diese Synthese gewissermaßen den Grundstock bildet für die in der letzten Zeit zahlreich durchgeführten Versuche, aus dem Tetramethylhaematoxylon das tetramethylierte Haematoxylin darzustellen, sei zunächst ihr Verlauf in kurzen Zügen skizziert. Es folgt dann die Beschreibung systematischer Reduktionsversuche am Tetra-

methylhaematoxylon, denen der Gedanke zugrunde lag, den heterocyklischen Neunerring des Diketons an den Kohlenstoffatomen 5 und 6 durch Reduktion wieder zum Chromindanring zu verknüpfen. Sie führten zu Verbindungen der Chromindan-Naphthocumaran- und Lyo-Chromindan- bzw. Oxido-lyo-chromindan-Reihe, Verbindungen, die dem tetramethylierten Haematoxilin schon recht nahe stehen.

A. Synthese des Tetramethylhaematoxylons. ¹⁾


1, 2, 10, 11-Tetramethoxy-lyo-chromindandion-(5, 6).

Die Synthese geht aus vom Pyrogalloldimethyläther, der mit β -Chlorpropionfäure kondensiert in die β -(5,6-Dimethoxy), phenoxypropionfäure (I) übergeht. Durch Behandeln mit P_2O_5 tritt Ringschluß zu einem heterocyklischen Sechsring, dem 7,8-Dimethoxychromanon (II) ein:




Läßt man auf dieses nun Veratrumaldehyd einwirken, so bildet sich unter Wasserabspaltung zwischen dem Carbonyl des Aldehyds und der Methylengruppe des Chromanons in 3-Stellung, ein Äthylenkörper, das 3-(3',4',-Dimethoxybenzal-)7,8-dimethoxychromanon (III), welches sich mit Wasserstoff leicht zu seinem Dihydroprodukt, dem 3-(3', 4'-Dimethoxybenzyl-), 7, 8-dimethoxychromanon (IV) reduzieren läßt:

¹⁾ P. Pfeiffer und Mitarbeiter, B.60, 2142 (1927), B. 61, 291 (1928).




Beim Behandeln mit Phosphorpentoxyd schließt sich dann unter Wasseraustritt der Indenring zum (3, 4:1', 2') 6', 7'-Dimethoxyinden-7, 8-dimethoxychromanon, dem Tetramethylanhydrohaematoxylin (V), (1, 2, 10, 11-Tetramethoxychrominden), das sich als Äthylenderivat leicht mit Wasserstoff katalytisch zu seinem Dihydrokörper, dem Tetramethyldeoxyhaematoxylin (VI), (1, 2, 10, 11-Tetramethoxychromindan) reduzieren läßt:



Dieses synthetisch erhaltene Chromindanderivat erfährt bei der Oxydation mit Chromsäure nun eine Aufspaltung der dem hetero-

zyklischen 6-Ring und 5-Ring gemeinsamen Valenzbrücke zwischen den Kohlenstoffatomen 5 und 6, unter Bildung zweier Carbonylgruppen an den betreffenden Kohlenstoffatomen. Diese heterocyklische Neunringverbindung, das Tetramethylhaematoxyion (VII), (1, 2, 10, 11-Tetramethoxy-lyochromindan-dion-(5, 6), erwies sich nun als identisch mit dem von Perkin¹⁾ durch Oxydation des tetramethylierten natürlichen Haematoxylins erhaltenen und schon lange bekannten Oxydationsprodukt:



dem Ausgangspunkt für die vorliegenden Untersuchungen.

In welcher enger Beziehung diese beiden synthetisch zugänglichen Verbindungen der Chromindan- bzw. Chromindenreihe mit dem tetramethylierten Haematoxylin selbst stehen, zeigen folgende Tatsachen: Bei der Reduktion des aus Haematoxylintetramethyläther gewonnenen Tetramethylhaematoxylons mit Phenylhydrazin erhielten Herzig und Pollak²⁾ eine Verbindung von der Zusammenfassung $\text{C}_{20}\text{H}_{20}\text{O}_5$, deren Identität mit dem synthetischen Tetramethylanhydrohaematoxylin von P. Pfeiffer³⁾ einwandfrei nachgewiesen wurde. Ebenso gelang es in neuerer Zeit⁴⁾ durch Reduktion des aus dem Naturprodukt gewonnenen Diketons mit Zinkamalgam und Salzsäure, das Tetramethyldeoxyhaematoxylin zu er-


1) Soc. 81, 1060 (1902).

2) B. 38. 2167 (1905).

3) B. 61. 291 (1928).


4) Diff. H. Kobs, Bonn, 1934, S. 27.

halten, das sich ebenfalls als vollkommen identisch mit dem auf synthetischem Wege zugänglichen Desoxykörper erwies:



Tetramethylanhydrohaematoxylin
(Chromindanderivat)

Tetramethylhaematoxylon
(Lyo-chromindanderivat)




Tetramethyldesoxyhaematoxylin
(Chromindanderivat)

B. Reduktionsprodukte der Chromindanreihe
(μ -Oxytetramethylhaematoxylin und seine Derivate).

1. μ -Oxytetramethylhaematoxylin (5,6-Dioxy-1,2,10,11-tetramethoxydromindan), und μ -Oxypentamethylhaematoxylin (5-Oxy-1,2,6,10,11-pentamethoxydromindan).


Vor einigen Jahren erhielten Perkin, Ray und Robinson¹⁾ bei der Reduktion des Trimethylbrafilons (I) mit Zinkstaub in alkoholischer Eisessiglösung ein Reduktionsprodukt von der Zusammenfassung $C_{19}H_{20}O_6$, das sie als Monooxyderivat des tetramethylierten Brafilins erkannten; sie erteilten ihm die Konstitution eines intramolekularen Pinakons (II): (entstanden durch die reduktive Verknüpfung der beiden Carbonylgruppen des Diketons):



Als Beweis für die Konstitution dieser Verbindung, die sich von dem tetramethylierten Brafilin nur durch ein Sauerstoffatom unterscheidet und daher zweckmäßig als μ -Oxytrimethylbrafilin bezeichnet wird, führen die Forscher die Tatsache an, daß sie sich durch Oxydation mit Chromsäure in das Trimethylbrafilon zurückverwandeln läßt. Durch die Darstellung des μ -Oxytrimethylbrafilins ergeben sich interessante Beziehungen zu bereits bekannten Derivaten des Brasileins. Bei der Methylierung des aus dem natürlichen Brafilin durch Oxydation gewonnenen Brasileins (III) erhielt


1) Perkin, Ray und Robinson, Soc. 1928, I. 1507, 1512.

ten Engels, Perkin und Robinson¹⁾ neben dem Trimethylbrafilein (IV) ein tetramethyliertes Produkt, das Tetramethyldihydrobrafilein (V):




Diese Verbindung lässt sich mit conc. Schwefelsäure unter CH_3OH -Abspaltung in ein Pyryliumsalz, das Trimethylifobrafileinsulfat (VI) überführen, das identisch ist mit dem Einwirkungsprodukt von conc. Schwefelsäure auf das μ -Oxytrimethylbrafilin:



1) Engels, Perkin und Robinson, Soc. 93, 1117, 1131, 1138.



Die Forscher geben an, daß das *p*-Oxytrimethylbrafilin die Fähigkeit besitzt, mit Säuren tiefrotgefärbte Salze zu bilden, die sie als Oxoniumsalze von dem Typus VII formulieren:



ohne aber Analysen der Salze anzugeben; sie setzen sie in nahe Beziehung zu den Salzen des Tetramethyldihydrobrafileinols (VIII) und einem aus Trimethylanhydrobrafilin (IX) durch Anlagerung von Brom entstehenden, tiefroten Bromid¹⁾:




Es wurde nun zunächst versucht, die analogen Verbindungen der Haematoxylinreihe darzustellen, mit der Absicht, durch Reduktion des zwischen den beiden Benzolringen befindlichen ter-

1) Das analoge Jodid stellte P. Pfeiffer durch Anlagerung von Jod an das Trimethylanhydrobrafilin dar (Bd. 61, 1927 (1928)), formulierte es jedoch als Carbeniumsalz. Über die verschiedenartige Formulierungsmöglichkeit dieser Salze siehe auch S. 42.

tiären Hydroxyls eine Synthese des tetramethylierten Haematoxy-
lins zu verwirklichen. Bei längerem Schütteln einer schwach eis-
essigsäuren, alkoholischen Lösung von Tetramethylhaematoxy-
lon mit Zinkstaub entstand neben dem schon bekannten Tetramethyl-
haematoxydonol und dem ebenfalls bekannten und a. a. O. beschrie-
benen Tetramethylhaematoxylopinakon, in stark schwankender
Ausbeute (15—30%), ein in farblosen Rhomboedern kristallisieren-
des Reduktionsprodukt, das einen scharfen Schmelzpunkt von 194°
hatte und dessen Analyse der Zusammenfetzung $C_{20}H_{22}O_7$ ent-
sprach.

Es mußte hier das dem μ -Oxytrimethylbrafilin entsprechende
 μ -Oxytetramethylhaematoxylin (X), also ein Dioxy-
tetramethoxychromindan, vorliegen:




Sein Verhalten gegenüber Oxydationsmitteln, es ließ sich mit
Chromsäure glatt zum Tetramethylhaematoxydon abbauen, zeigte
die Richtigkeit dieser Vermutung.

Die alkoholische Natur des am Kohlenstoffatom 6 befind-
lichen tertiären Hydroxyls konnte durch die Darstellung eines
Methyläthers sichergestellt werden, die ihre Parallele in der
Darstellung des Pentamethylhaematoxylins aus Tetramethylhaema-
toxylin¹⁾ findet. Bei längerem Behandeln einer conc. alkoholischen

1) Herzig, M. 15, 141—144.


Löfung des μ -Oxytetramethylhaematoxylin mit Jodmethyl in conc. alkalischer Löfung auf dem Wasserbad, bildete sich das μ -Oxypentamethylhaematoxylin (XI) als eine in farblosen, dünnen, quadratischen Blättchen kristallisierende Substanz vom Schmelzpunkt $144-147^\circ$, deren Analyse sehr gut auf die Zusammenfetzung $C_{20}H_{21}O_6 \cdot OCH_3$ stimmte:



Der oxydative Abbau zum Tetramethylhaematoxylin erwies die Zugehörigkeit des μ -Oxypentamethylhaematoxylin zur Chromindanreihe; da der Methyläther ebenso wie sein Grundkörper, das μ -Oxytetramethylhaematoxylin, tiefgefärbte Salze bildet, kommt für die Methylierung nur die Hydroxylgruppe am Kohlenstoffatom 6 in Betracht.

Das μ -Oxypentamethylhaematoxylin ist seiner Konstitution nach identisch mit dem von Engels, Perkin und Robinson¹⁾ aus Haematein (XII) erhaltenen Methylierungsprodukt von der Zusammenfetzung $C_{21}H_{24}O_7$, dem Pentamethyldihydrohaemateinol (XIII):

1) Soc. 93, 1143 (1908).




das optisch aktiv sein muß, während das μ -Oxypentamethylhaematoxylin natürlich inaktiv ist; unbestimmt bleibt noch, ob das aktive Pentamethyldihydrohaemateinol der cis- oder der trans-Reihe angehört ¹⁾.

Durch Einwirkung von conc. Schwefelsäure sowohl auf das μ -Oxytetramethylhaematoxylin, wie auf das μ -Oxypentamethylhaematoxylin bildete sich ein und dasselbe Pyryliumsalz, das Tetramethyliso-haemateinsulfat (XIV); es erwies sich nach Kristallform (orangerote lange Kristallnadeln), Löslichkeit in Wasser und schwachgrünlicher Fluoreszenz der wässrigen Lösung als völlig identisch mit dem von Perkin ²⁾ dargestellten Isohaemateinsulfat von der Zusammenfassung $C_{20}H_{18}O_5$]SO₃H:

1) Daß das μ -Oxypentamethylhaematoxylin vom Schmelzpunkt 147° als Abkömmling des μ -Oxytetramethylhaematoxylin die cis-Konfiguration besitzt, geht aus den Erörterungen auf S. 40 hervor.


2) Soc. 93, 1138.



Die Konstitutionsformel des μ -Oxytetramethylhaematoxyliins, vor allem das Vorhandensein zweier Hydroxyle, erfuhr eine schöne Bestätigung dadurch, daß es gelang, ein Acetonkondensationsprodukt unter Bildung eines cycloacetalartigen Fünferinges darzustellen. Diese Reaktion, die ganz allgemein zum Nachweis der cis-Stellung zweier einander benachbarter alicyclischer Hydroxylgruppen dient, ist ein Beweis dafür, daß sich im μ -Oxytetramethylhaematoxylin die an den Kohlenstoffatomen 5

und 6 befindlichen tertiären Hydroxylgruppen in *cis*-Stellung zueinander befinden. Für das μ -Oxypentamethylhaematoxylin als dem Methyläther des μ -Oxytetramethylhaematoxylyns ergibt sich daraus ebenfalls die *cis*-Konfiguration.

Beim langsamen Verdunsten einer schwach sauren Lösung des μ -Oxytetramethylhaematoxylyns in wasserfreiem Aceton schied sich das Kondensationsprodukt in fast farblosen Krusten ab, die aus Alkohol lange farblose Nadeln vom Schmelzpunkt 157° bildeten. Ihre Zusammensetzung entsprach der Formel $C_{23}H_{26}O_7$, so daß sich folgende Konstitutionsformel ergibt:



2. Salze des μ -Oxytetramethylhaematoxylyns und des μ -Oxypentamethylhaematoxylyns:

Die von Perkin und Robinson¹⁾ gefundene charakteristische Reaktion des μ -Oxytrimethylbrafilins, mit Säuren unter besonderen Bedingungen schön kristallisierte, tiefrotgefärbte Salze zu bilden, die die Forscher als Oxoniumsalze (siehe Seite 34, Formel VII) formulieren, läßt sich auf das μ -Oxytetramethylhaematoxylin und das μ -Oxypentamethylhaematoxylin ohne weiteres übertragen. Schon die tiefrote Lösungsfarbe der beiden Oxykörper in conc.

1) Perkin, Ray und Robinson, Soc. 1928, I, 1507.

Säuren (Schwefelsäure, Salzsäure, Überchlorsäure, Ameisensäure usw.) läßt auf ein derartiges Salzbildungsvermögen schließen. Bei vorsichtigem Zusatz der entsprechenden Säure zu einer conc. alkoholischen Lösung der Oxyverbindungen bilden sich ohne weiteres die durchweg tiefrot gefärbten Salze der beiden Körperklassen, wobei diejenigen der μ -Oxypentamethylhaematoxylinreihe einen etwas tieferen Farbton zeigen als die der μ -Oxytetramethylhaematoxylinreihe.

Folgende Salze wurden dargestellt und analysiert:


- | | |
|---|--|
| <p><i>μ-Oxytetramethylhaematoxylinreihe:</i></p> <p>1) $C_{20}H_{21}O_6)Cl$
tiefrote Nadeln</p> <p>2) $C_{20}H_{21}O_6)Br$
tiefrote Nadeln</p> <p>3) $C_{20}H_{21}O_6)ClO_4$
rotviolette Nadeln</p> <p>4) $C_{20}H_{21}O_6)J$
tiefrote Nadeln mit messinggelbem Oberflächenglanz.
Leicht zersetzlich</p> <p>5) $C_{20}H_{21}O_6)SO_4H$
tiefrote Nadeln.</p> | <p><i>μ-Oxypentamethylhaematoxylinreihe:</i></p> <p>1) $C_{21}H_{23}O_6)Cl \cdot 2H_2O$
tiefrote Nadeln mit grünem Oberflächenglanz</p> <p>2) $C_{21}H_{23}O_6)Br \cdot H_2O$
tiefrote Nadeln mit grünem Oberflächenglanz</p> <p>3) $C_{21}H_{23}O_6)ClO_4$
violette Nadeln.</p> |
|---|--|

Die Lösungsfarbe der Salze in den ihnen entsprechenden Säuren ist durchweg tiefrot.

Schon Perkin, Ray und Robinson haben darauf hingewiesen, daß das Salzbildungsvermögen des μ -Oxytrimethylbrasilins den durch o- und p-ftändige Methoxylgruppen substituierten Triphenylcarbinolen an die Seite zu stellen ist. Nach der von W. Dilthey und R. Wizinger¹⁾ entwickelten Farbtheorie auf koordinations-theoretischer Grundlage müssen wir die Salze unserer

1) Siehe R. Wizinger, Organische Farbstoffe, Bonn 1933.

beiden Reihen als Carbeniumsalze auffassen, während Perkin und seine Mitarbeiter von Oxoniumsalzen sprechen. Nach der Dilthey-Wizingerschen Auffassung wird das zwischen den beiden Benzolringen befindliche Kohlenstoffatom 5 durch die positivierende Wirkung der in p-Stellung sitzenden Methoxyle derartig beeinflusst, daß die an ihm haftende Hydroxylgruppe schwach basischen Charakter erhält und unter Wasseraustritt mit den entsprechenden Säuren echte Salze zu bilden vermag. Wir können daher das μ -Oxytetramethylhaematoxylin und das μ -Oxypentamethylhaematoxylin als Diphenylmethancarbinolbasen mit aliphatischer Seitenkette auffassen ¹⁾ und den Salzen die Formel II geben:



Der positivierende Einfluß der p-ständigen Methoxyle beider Benzolringe auf das Kohlenstoffatom 5 als Chromophor und damit der basische Charakter der an ihm haftenden Hydroxylgruppe scheint jedoch nicht allzu stark zu sein, da die Salze sämtlich außer-

¹⁾ Es sei hier auf die Salzbildung beim Tetramethylisoaematoxylin (f. S. 54) verwiesen, der die gleichen Betrachtungen zu Grunde gelegt werden können.


ordentlich feuchtigkeitsempfindlich sind und schon durch Wasser in das entsprechende Carbinol zurückverwandelt werden können¹⁾.

Während die Sulfate und Perchlorate beider Reihen schon nach kurzem Trocknen im Vakuum wasserfrei sind, kristallisieren die Chloride und Bromide der μ -Oxypentamethylhaematoxylinreihe mit einem wechselnden Gehalt an Wasser und überschüssiger Säure. Erhitzt man die Salze auf $35-45^{\circ}$, so wird zwar die überschüssige Säure entfernt, es bleiben dann aber Hydrate der normalen Salze von bestimmtem Wassergehalt, der sich durch Erhitzen auf höhere Temperatur nicht entfernen läßt, da eine komplizierte Zersetzung eintritt. Dieses Verhalten findet seine Parallele in der von R. Willstätter und seinen Mitarbeitern²⁾ gemachten Beobachtung, daß Pelargonidin, Cyanidin, Delphinidin, Oenidin und Malvidin ebenfalls einen sehr wechselnden Wassergehalt besitzen, der durch Trocknen, selbst im Hochvakuum, manchmal sehr schwer und oft nur unter teilweiser Zersetzung der Salze zu entfernen ist.

Bei kurzem Kochen des μ -Oxytetramethylhaematoxylinulfats (XV) in conc. Schwefelsäure bildete sich das Tetramethylisohaemateinsulfat (XVI) in orangeroten, in Wasser spielend löslichen Nadeln, deren Analyse auf die Zusammenfassung ($C_{20}H_{16}O_5$) SO_4H stimmte und die vollkommen identisch waren mit dem aus μ -Oxytetraemethylhaematoxylin und μ -Oxypentamethylhaematoxylin durch Behandeln mit warmer conc. Schwefelsäure auf direktem Wege dargestellten Isohaemateinsalz. Daraus ist wohl zu schließen, daß die Pyryliumsalzbildung über die Stufe des μ -Oxyhaematoxylinfalzes geht:

1) Die beiden Oxyverbindungen können in gewisser Beziehung den Pseudobasen der Anthocyanidine zur Seite gestellt werden. Es gelang jedoch nicht, die ihnen entsprechende Farbbase darzustellen. Dieses abweichende Verhalten der Haematoxylinfalze gegenüber den Anthocyanidinen hat wohl seinen Grund in der viel schwächeren Positivierung des C-Atoms im μ -Oxytetramethylhaematoxylin, sodaß die ionoiden Salze bei der Hydrolyse sofort in die nichtionoiden Pseudo- oder Carbinolbase übergehen.


2) R. Willstätter und Mitarbeiter A. 408, S. 2 ff. (1915).




1) Welche der beiden Schreibformen hervorzuheben ist, kann vorläufig auch nicht entschieden werden. Als Vertreter der Vinylcarbeniumsalze ist es für die Isohaemateinfalze zunächst ohne Belang, welchem der beiden in Frage kommenden C-Atome man hier den ungefättigten ionoiden Chromophorcharakter zuschreibt.

3. Reduktionsversuche am μ -Oxytetramethylhaematoxylin und μ -Oxypentamethylhaematoxylin:

Die Versuche, das in den beiden Oxyverbindungen am Kohlenstoffatom 5 haftende Hydroxyl zu reduzieren, also gewissermaßen die den Carbinolen entsprechenden Leukoverbindungen, d. h. das Tetramethyl- bzw. Pentamethylhaematoxylin, darzustellen, nahmen einen gänzlich unerwarteten Verlauf. Schon Perkin, Ray und Robinson¹⁾ hatten bei dem Versuch, das μ -Oxytrimethylbrafilin mit Zinkstaub und salzfährehaltiger Essigsäure zum Trimethylbrafilin zu reduzieren, das Trimethylanhydrobrafilin erhalten. Trotz der Anwendung der verschiedensten Reduktionsmittel gelang es bisher nicht, das μ -Oxytetramethylhaematoxylin einseitig zu reduzieren, die Reduktion erfolgte vielmehr stets an beiden Hydroxylgruppen gleichzeitig. Je nach der angewandten Arbeitsmethode wurden entweder beide Hydroxyle des μ -Oxytetramethylhaematoxylins durch Wasserstoffatome ersetzt unter Bildung des Tetramethyldesoxyhaematoxylins (XVII), oder aber es entstand durch reduktive Abspaltung beider OH-Gruppen, unter Ausbildung einer Doppelbindung der entsprechende Aethylenkörper, das Tetramethylanhydrohaematoxylin (XVIII):



1) Perkin, Ray und Robinson, Soc. 1928, I, S. 1512.



XVIII

Folgende Tabelle möge eine Übersicht über die Reduktionsversuche am μ -Oxytetramethylhaematoxylin geben:

<i>Reduktionsmittel</i>	<i>Lösungsmittel</i>	<i>Reduktionsprodukt</i>
aktivierter Wasserstoff	Eisessig	Tetramethyldesoxyhaematoxylin, F: 151°
Natriumhyposulfit	Verd. wäßrige Salzsäure + Alkohol	Tetramethylanhydrohaematoxylin, F: 172°
Zinkstaub	Eisessig + 10%ige Salzsäure	Tetramethylanhydrohaematoxylin, F: 172°
Zinkstaub	Essigsäureanhydrid	Tetramethylanhydrohaematoxylin, F: 172°
Zinkstaub	Eisessig	Ausgangsprodukt, z. T. verharzt
Zinkstaub	Alkohol und 10%iger Eisessig	Ausgangsprodukt
Ameisensäure „	in der Kälte in der Wärme	Ausgangsprodukt verharzt
Natriumamalgam	Alkohol und 10%iger Eisessig	Ausgangsprodukt z. T. verharzt

<i>Reduktionsmittel</i>	<i>Lösungsmittel</i>	<i>Reduktionsprodukt</i>
Calciumhydrid	Eisessig	Ausgangsprodukt z. T. verharzt
Zinkstaub + Ammonchlorid	verd. wäßriger Alkohol	Ausgangsprodukt
Schwefelwasser- stoff	Alkohol	Ausgangsprodukt
Aluminiumgrieß	Alkoholische Kalilauge	Ausgangsprodukt
Calciumhydrid	Aceton, Wasser	Ausgangsprodukt
Natriumamalgam	verd. wäßriger Alkohol	Ausgangsprodukt

Die mit μ -Oxytetramethylhaematoxylinchlorid- und -sulfat durchgeführten Reduktionsversuche ergaben die gleichen Resultate, nur trat, vor allem beim Arbeiten in saurem Medium, viel leichter Verharzung ein.

Um die gleichzeitige Reduktion beider Hydroxylgruppen vermeiden zu können, wurde nunmehr das μ -Oxypentamethylhaematoxylin, in welchem ja die tertiäre alkoholische Hydroxylgruppe am Kohlenstoffatom 6 durch Methylierung geschützt ist, obigen Reduktionsmethoden unterworfen. Wider alles Erwarten bildeten sich jedoch auch hier die gleichen Reduktionsprodukte, die bei dem noch nicht methylierten Oxykörper, dem μ -Oxytetramethylhaematoxylin, gefunden worden waren. Dieses Ergebnis überrascht umso mehr, als hier der an sich seltene Fall einer reduktiven Aufspaltung einer an einen aliphatischen Rest gebundenen Methoxylgruppe vorliegt. Er findet seine Parallele in einer erst vor kurzem von Kindler und Pefschke¹⁾ mitgeteilten Beobachtung; diese erhielten bei dem Versuch, das β -(3, 4-Dimethoxyphenyl)- β -methoxynitroethan (XIX) zu der entsprechenden Amino-

1) Kindler und Pefschke, A. 519, 292 (1935).

verbindung zu reduzieren, überraschenderweise das β -(3, 4-Dimethoxyphenyl)-aethylamin (XX):




Tabelle der Reduktionsversuche am μ -Oxypentamethylhaematoxylin.

<i>Reduktionsmittel</i>	<i>Lösungsmittel</i>	<i>Reduktionsprodukt</i>
aktivierter Wasserstoff	Alkohol	Ausgangsprodukt
aktivierter Wasserstoff	Eisessig	Tetramethyldesoxyhaematoxylin, F: 151°
Natriumhyposulfit	verd. wäßrige HCl + Alkohol	Tetramethylanhydrohaematoxylin, F: 172°
Zinkstaub ¹⁾	Eisessig + 10%ige Salzsäure	Tetramethylanhydrohaematoxylin, F: 172°

C. Reduktionsprodukte der Tetramethylisohaematoxylin-Reihe.

α - und β -Tetramethyl-isohaematoxylin. ²⁾

Daß die Verknüpfung der beiden Carbonylkohlenstoffatome 5 und 6 im Neunerring des Trimethylbrafilons und des Tetrame-

¹⁾ Vgl. Perkin, Ray und Robinson. Soc. 1928, I, 1512.

²⁾ Da die Konstitution dieser Verbindungen noch nicht endgültig feststeht wird die neue Bezeichnungsweise an ihnen zunächst noch nicht durchgeführt.

thylhaematoxylons prinzipiell möglich ist, hatten schon Herzig und Pollak¹⁾ durch die Darstellung der Anhydrokörper beider Reihen bei der Reduktion der Diketone mit Phenylhydrazin gezeigt. Die erst in den letzten Jahren von P. Pfeiffer und Mitarbeitern²⁾ wieder aufgenommenen Versuche, mit den verschiedensten Reduktionsmitteln einen Ringschluß in 5,6-Stellung zu Chromindanderivaten durchzuführen, ergaben vor allem beim Behandeln der beiden Diketone mit Magnesium in Eisessiglösung eine Reihe interessanter Reduktionsprodukte, die der Gegenstand weiterer eingehender Untersuchungen waren³⁾. Dabei zeigte sich, daß 2 von den 3 bis jetzt bekannten Reduktionsprodukten nicht der Chromindanreihe angehören, daß hier die Reduktion vielmehr nur an einer der beiden Carbonylgruppen des Neunerrings stattgefunden hatte, ohne daß Ringschluß eingetreten war. Das Ziel der hier vorliegenden Untersuchungen war nun, diese Reduktion in der Haematoxylinreihe völlig aufzuklären; vor allem versprach die Untersuchung des dritten Reduktionsproduktes, des sogen. Tetramethyl-iso-haematoxylins, das seiner Zusammensetzung nach isomer mit dem tetramethylierten Haematoxylin ist, einen Erfolg.

Es sollen nun zunächst kurz die beiden bereits bekannten Reduktionsprodukte, das Tetramethylhaematoxylonol (1) und das Tetramethylhaematoxylopinakon (2), beschrieben werden; im 3. Abschnitt folgen dann die Untersuchungen am Tetramethyl-iso-haematoxylin.

1) Tetramethylhaematoxylonol (5-Oxy, 1,2,10,11-Tetramethoxy-lyo-chromindan)




Dieses Reduktionsprodukt, das bei fast allen Reduktionen des Diketons entsteht, wurde lange Zeit als eine Verbindung mit der

1) Herzig und Pollak B. 38, 2166 (1905).

2) Pfeiffer, Angern, Haack und Willems, B. 61, 1923 ff. (1928).


3) Journ. 137, 227 (1933).

Verknüpfung der Kohlenstoffatome 5 und 6 oder 5 und 7 aufgefaßt; die endgültige Konstitutionsaufklärung wurde von R. Hilpert in der Brafilinreihe und von H. Kobs in der Haematoxylinreihe durchgeführt. Danach kommt dem Tetramethylhaematoxylonol folgende Konstitution zu:



Es bildet aus Alkohol farblose Nadeln vom maximalen Schmelzpunkt 188°, die sich in conc. Schwefelsäure mit violetter Farbe und rein blauem Ablauf lösen. Daß in ihr eine Hydroxylgruppe vorhanden ist, konnte durch eine quantitative Bestimmung des aktiven Wasserstoffs nach Zerevitinoff sowie durch die Bildung eines Monoacetylderivates bewiesen werden. Das Vorliegen einer Ketogruppe ergab sich aus der Existenz eines Monoxims. Besonders beweisend für die aufgestellte Konstitutionsformel war jedoch der oxydative Abbau des Tetramethylhaematoxylonols zu dem von Perkin¹⁾ synthetisieren Dihydrohaematoxylinfäurelaktone (I), das man sich auf folgende Art entstanden denken kann:

1) Perkin und Robinson, Soc. 93, 496 (1908).



Alle diese Tatsachen lassen daher eindeutig den Schluß zu, daß bei der Reduktion des Tetramethylhaematoxylons zum Tetramethylhaematoxylonol nur die Carbonylgruppe in 5-Stellung zur sekundären Alkoholgruppe reduziert wird, indem der heterocyclische Neunerling erhalten bleibt.

Die Vermutung, daß sich durch eine weitere Reduktion des Tetramethylhaematoxylonol eventuell doch noch ein Ringchluß zwischen den beiden Kohlenstoffatomen 5 und 6 durchführen lassen würde, ließ sich bis jetzt leider nicht bestätigen. Alle angestellten Reduktionsversuche ¹⁾ (mit Zink und Eisessig, Zinkamalgam

1) Siehe auch H. Kobs, Diff. Bonn 1934, S. 32.

und alkoholischer Salzfäure, sowie katalytische Reduktion mit Wasserstoff) führten teils zu einem völligen Abbau, teils ergaben sie das Ausgangsprodukt zurück. Doch steht zu hoffen, daß Reduktionsversuche unter wesentlich milderen Bedingungen, wie sie bei anderen Versuchen ausgearbeitet wurden, doch noch zu dem gewünschten Ringschluß führen werden.

2. α -Tetramethylhaematoxylopinakon




In wesentlich geringerer Ausbeute als das Tetramethylhaematoxylopylonol entsteht ein Reduktionsprodukt vom Schmelzpunkt 287° , für das in der vorläufigen Mitteilung¹⁾ die Zusammensetzung $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_7$ angenommen wurde. Vor einigen Jahren konnten nun P. Pfeiffer und Mitarbeiter²⁾ in der Brasilinreihe zeigen, daß bei der Bildung des entsprechenden Reduktionsproduktes auf ein Molekül Diketon nur ein Wasserstoffatom aufgenommen wird. Daraus folgt, daß die Formel verdoppelt werden muß und es sich um eine pinakonartige Verknüpfung zweier Carbonylgruppen von zwei verschiedenen Molekülen des Diketons handelt. Je nachdem nun die beiden Carbonylgruppen in 5-Stellung oder in 6-Stellung unter Bildung zweier tertiärer Hydroxylgruppen verknüpft sind, entstehen 2 strukturisomere Pinakone, von denen das 5, 5'-Pinakon als α -Trimethylbrasilopinakon (F: 277° , Halochromie in conc. Schwefelsäure: grün) und das 6, 6'-Pinakon mit dem Schmelzpunkt 294° und gelber Halochromie als β -Trimethylbrasilopinakon bezeichnet wurde.

In der vorliegenden Untersuchung konnte in der Haematoxylinreihe bis jetzt eine derartige Verbindung erhalten werden, die in ihrem Verhalten eine weitgehende Übereinstimmung mit dem α -Trimethylbrasilopinakon zeigt und als α -Tetramethylhaematoxylopinakon bezeichnet werden soll. Sie kann durch ihre Alkalinunlöslichkeit von dem daneben gebildeten Oxyketon leicht abgetrennt werden. Aus Eisessig bildet sie kleine farblose Blättchen, die sich bei 287° unter vorhergehender Braunfärbung zersetzen und sich in conc. Schwefelsäure primär mit tannengrüner Farbe lösen, die rasch in

1) B. 61, 1926 (1928).


2) Journ. 137, 228 (1933).

ein schmutziges Braunrot übergeht. Die Analyse sowie eine Molekulargewichtsbestimmung lassen eindeutig auf ein bimolekulares Pinakon von der Zusammenfetzung $C_{10}H_{12}O_7$ schließen, sodaß dieser Verbindung wohl folgende Konstitutionsformel zukommt:



Das Vorhandensein zweier Hydroxylgruppen konnte durch die Darstellung eines Diacetylderivates, das aus Eisessig farblose Nadelchen vom Schmelzpunkt 291° bildet, eindeutig bewiesen werden; dagegen gelang es nicht, in Übereinstimmung mit den Versuchen in der Braßilinreihe, die beiden Ketogruppen durch Bildung eines Oxims eindeutig festzulegen. Durch Oxydation mit Chromsäure ließ sich das Pinakon glatt zum Tetramethylhaematoxylen zurückoxydieren, ein Beweis dafür, daß sich die beiden Diketone während der Reduktion nicht umlagern, das ursprüngliche Kohlenstoffskelett im Pinakon also unverändert vorhanden ist.

3. α -Tetramethyl-10haematoxylin:



Am meisten Interesse bot die Untersuchung des monomolekularen dritten Reduktionsproduktes, das früher schon P. Pfeiffer und seine Mitarbeiter¹⁾ bei der Reduktion des Diketons mit Mag-



1) P. Pfeiffer und Mitarbeiter, B. 61, 1931 (1928).

nesium und Eisessig in geringer Menge isolieren konnten und als strukturisomer mit dem tetramethylierten Haematoxylin erkannten. Die zunächst angestellten Versuche, die Ausbeute an dieser leider nur in geringer Menge entstehenden Verbindung zu verbessern, führten nur zum Teil zum Erfolg. Immerhin gelang es, ein Verfahren auszuarbeiten, nach dem die drei bei der Reduktion des Diketons nebeneinander entstehenden Reduktionsprodukte leicht und schnell voneinander zu trennen sind (siehe Praktischer Teil). Die Ausbeute an α -Tetramethyl-iso-haematoxylin betrug im besten Falle 1,5—2% des angewandten Ausgangsproduktes. Aus Alkohol kristallisiert es in farblosen Nadeln vom Schmelzpunkt 196° , die sich in conc. Schwefelsäure blutrot mit gleicher Ablauf-farbe lösen. Die Analyse stimmt scharf auf die Formel $C_{20}H_{22}O_6$, die auch dem Tetramethylhaematoxylin zukommt; wir bezeichnen daher dieses Reduktionsprodukt als Tetramethyl-iso-haematoxylin.

Über die Konstitution des Tetramethyl-iso-haematoxylins kann nach dem jetzigen Stand der Untersuchungen folgendes gesagt werden.

Eindeutig geklärt ist die Funktion des sechsten Sauerstoffatoms. Der positive Nachweis eines aktiven Wasserstoffatoms nach Zere-witinoff läßt auf die Anwesenheit einer Hydroxylgruppe schließen. Da nun die Halochromie der Isoverbindung, im Gegen-satz zu der des Tetramethylhaematoxylins (schwachgelb) eine sehr tieffarbige (blutrot) ist, kann sich diese Hydroxylgruppe nur an dem die beiden Benzolringe verknüpfenden Kohlenstoffatom 5 be-finden. Durch den Einfluß der an den beiden Phenylresten sitzen-den vier Methoxyle ist dieses C-Atom derart positiviert, daß wir nicht mehr einen eigentlichen tertiären Alkohol vor uns haben, sondern eine Hydroxylverbindung, die den methoxylierten Diphe-nyl- und Triphenylcarbinolen entspricht. Es erklärt sich auch so die Existenz eines tiefrot gefärbten Perchlorates. Das tertiäre Hydroxyl zu acetylieren oder zu benzoylieren gelang nicht, was wiederum im Einklang mit den am Triphenylcarbinol und seinen Derivaten beobachteten Tatsachen steht.

Wenn man tiefgreifende Umlagerungen ausschließt, kommen nach alledem für das Tetramethyl-iso-haematoxylin nur die beiden Konstitutionsformeln a und b in Betracht:





Während in der Formel a die beiden Kohlenstoffatome 5 und 6 zu einem Chromindanring verknüpft sind, hat in der Formel b eine Kondensation zwischen den Kohlenstoffatomen 5 und 7 unter Herausbildung eines Naphthalinringystems stattgefunden. Beide Formulierungen erklären die Eigenschaften des Tetramethylifohaematoxylin in gleicher Weise.

Um zwischen beiden Formeln eine Entscheidung treffen zu können, wurde versucht, das Tetramethylifohaematoxylin zu oxydieren, um aus dem Oxydationsprodukt eventuell einen Schluß auf die endgültige Konstitution ziehen zu können. Leider nahm die Oxydation einen ganz unerwarteten Verlauf. Während ganz allgemein die Chromindanderivate, wie Tetramethylhaematoxylin oder Tetramethyldesoxyhaematoxylin bei der Oxydation unter Aufspaltung der 5,6-Brücke in das Tetramethylhaematoxylin übergehen, entstand bei der Behandlung des Tetramethylifohaematoxylin mit Chromsäure ein Oxydationsprodukt, das zwar die gleiche Zusammensetzung wie das Tetramethylhaematoxylin, $C_{20}H_{20}O_7$, besitzt, sich aber von diesem durch seine Eigenschaften derart charakteristisch unterscheidet, daß es als Strukturisomer mit dem Diketon angesehen werden muß. Es bildet aus Alkohol farblose Nadeln vom Schmelzpunkt 172° , die sich in conc. Schwefelsäure blutrot lösen. Folgende Tabelle der beiden Strukturisomeren Verbindungen zeigt recht deutlich die charakteristischen Unterschiede:

	Schmelzpunkt	Lösungsfarbe in conc. H ₂ SO ₄	
Tetramethylhaematoxylon	192—196°	orange-gelb	Bildet ein Oxim, aber kein Acetyl- derivat
Tetramethyl-oxo- isohaematoxylon	172°	blutrot	Bildet ein Acetyl- derivat, aber kein Oxim

Daß dieses Oxydationsprodukt, das im Folgenden Tetramethyl-oxo-iso-haematoxylon genannt werden soll, seine Hydroxylgruppe am Kohlenstoffatom 5 behalten hat, geht schon aus seiner Lösungsfarbe in conc. Schwefelsäure hervor, die ebenso tieffarbig wie die des Ifokörpers selbst ist, während das Tetramethylhaematoxylon nur eine gelbe Lösungsfarbe in Schwefelsäure zeigt.


Für die Aufstellung einer Konstitutionsformel kommen nun eine ganze Reihe von Möglichkeiten in Frage: Ausgehend von der Chromindanformel a des Tetramethylisohaematoxylins sind folgende beiden Formeln möglich:




Beide erklären zwar die tiefe Halochromie des Oxydationsproduktes, werden aber seinem Verhalten gegenüber Hydroxylamin und Semicarbazid (es gelang nicht, eine Ketogruppe nachzuweisen) in keiner Weise gerecht. Zudem müßte sich nach Formel d der Lacton-

ring leicht mit Alkali zur entsprechenden Oxycarbonfäure verfeifen lassen, was ebenfalls nicht gelang, (die Substanz ist sehr beständig gegen Alkali).

Aus der Naphtocumaranformel b des Tetramethyl-isohaematoxylin läßt sich durch Oxydation der Methylengruppe in 6-Stellung zur Carbonylgruppe eine Konstitutionsformel e für das Tetramethyloxoifohaematoxylin ableiten, welche auch noch gewissen Bedenken unterliegt, da nach dieser Formulierung die Bildung eines Oxims zu erwarten wäre:



Eine endgültige Klärung dieser Konstitutionsfragen kann nur ein weiteres Studium des Tetramethyl-oxo-iso-haematoxylin's erbringen. Vor allem muß versucht werden, durch Wasserabspaltung an den Kohlenstoffatomen 5 und 7 zum Tetramethyl- α -anhydrohaematoxylin zu kommen, das schon von Perkin¹⁾ sowie von Herzig und Pollak²⁾ näher untersucht worden ist:



Tetramethyl- α -anhydrohaematoxylin

1) Perkin und Robinson, Soc. 93, 502 (1903).

2) Herzig und Pollak, B. 36, 3713 (1903).

um damit den endgültigen Beweis zu erbringen, daß das Tetramethyl-oxo-iso-haematoxylin und damit auch das Tetramethyl-iso-haematoxylin selbst zu der Klasse der Naphtocumarane gehört.

Leider wird die weitere Untersuchung dieser interessanten Körperklasse durch die schwierige Zugänglichkeit des Tetramethyl-iso-haematoxylin sehr erschwert.

4. β -Tetramethyl-iso-haematoxylin:



Ein besonders bemerkenswertes Resultat wurde erhalten, als das α -Tetramethyl-iso-haematoxylin vom Schmelzpunkt 196° mit Phosphorpentoxyd behandelt wurde. Es entstand dabei eine in farblosen Nadeln kristallisierende Verbindung vom Schmelzpunkt 163° , die die gleichen Summenformel wie das Ausgangsprodukt: $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_6$ besitzt. Sie löst sich in conc. Schwefelsäure ebenfalls in blutroter Farbe; auch bildet sie mit Überchlorsäure ein tiefrot gefärbtes Perchlorat in Form langer Kristallnadeln. Bei der Oxydation mit Chromsäure liefert sie ein Oxydationsprodukt, das sich nach Kristallform, Schmelzpunkt und Lösungsfarbe in conc. Schwefelsäure als vollkommen identisch mit dem Tetramethyl-oxo-iso-haematoxylin erwies. Die Darstellung eines Oxims gelang zwar auch bei der niedriger schmelzenden Form nicht; jedoch ließ sich bei ihr — im Gegensatz zum Verhalten der höher schmelzenden Form — mit Essigsäureanhydrid ein Acetylderivat in Form farbloser Nadeln vom Schmelzpunkt 144° darstellen.

Die Eigenschaften der beiden isomeren Formen des Tetramethyl-iso-haematoxylin deuten darauf hin, daß es sich hier nur um eine Verschiedenheit in ihrem räumlichen Bau handeln kann, daß also hier stereoisomere Formen vorliegen (s. auch S. 23). Die Frage, welcher der beiden Formen die cis-Konfiguration und welcher die trans-Konfiguration zukommt, läßt sich noch nicht entscheiden. Vorläufig soll die höher schmelzende Form als die α —, die niedriger schmelzende als die β -Form bezeichnet werden.

Eine Zusammenstellung der Eigenschaften beider isomeren Formen läßt ihre nahe Verwandtschaft deutlich erkennen:

	Schmelzpunkt:	H ₂ SO ₄ - Reaktion:	HClO ₄ - Reaktion:	Oxydation mit CrO ₃ :	Eigenschaften
α -Tetramethylisohaematoxylin C ₂₀ H ₂₂ O ₆	196°	blutrot	tiefrotes Perchlorat	Tetramethyloxo-isohaematoxylin C ₂₀ H ₂₀ O ₇	Instabile Form. Läßt sich mit P ₂ O ₅ in die β -Form umlagern. Gibt kein Acetylderivat
β -Tetramethylisohaematoxylin C ₂₀ H ₂₂ O ₆	163°	blutrot	tiefrotes Perchlorat	Tetramethyloxo-isohaematoxylin C ₂₀ H ₂₀ O ₇	Stabile Form. Läßt sich nicht in die α -Form umlagern. Gibt ein Acetylderivat: C ₂₀ H ₂₁ O ₆ · (COCH ₃)


D. Reduktionsprodukte der Oxido-lydchromindan-Reihe.

α - und β -Tetramethyl-allohaematoxylin:

Die Reduktion des Trimethylbrafilons mit Natrium-Amalgam, die schon vor einigen Jahren von P. Pfeiffer und Mitarbeitern¹⁾ näher untersucht worden ist, führt in der Hauptsache zu einem Produkt, das die gleiche empirische Zusammensetzung wie das trimethylierte Brafilin, C₁₈H₂₀O₅, besitzt, sich von diesem aber durch seine Eigenschaften ganz charakteristisch unterscheidet. Auf Grund einer eingehenden Untersuchung²⁾ wurde die zunächst gemachte Annahme daß ein Monooxykörper: C₁₈H₁₈ (OCH₃)₃ (OH) vorlag, fallen gelassen und der Verbindung die Konstitution eines Oxidokörpers entsprechend der Formel:


1) Ber. 61, 1928 (1928).


2) Journ. f. pr. Chemie 140, 9 ff. (1934).



gegeben.


Die Formulierung als cyclischen Aether konnte für dieses Reduktionsprodukt, das auf Grund seiner Strukturisomerie mit dem Tetramethylbrafilin, Trimethyl-allobrafilin genannt wurde, dadurch sichergestellt werden, daß in ihm weder eine Ketogruppe nachzuweisen war, noch ein aktives Wasserstoffatom nach der Methode von Zerewitinoff festgestellt werden konnte. Ferner gelang es, das Molekül des Trimethyl-allobrafilins (I) durch Behandeln mit Wasserstoff in Gegenwart von Palladium an den beiden sauerstoffhaltigen Ringen aufzuspalten und in ein Diphenylmethanderivat (II) überzuführen, das sich durch Oxydation mit Wasserstoffsuperoxyd zu einer einfachen Diphenylmethancarbonsäure (III) abbauen ließ:





Dadurch war gezeigt, daß während der Reduktion keine Verlagerung der Benzolringe gegeneinander stattgefunden hatte. Als es nun noch gelang, die Abbaufäure III synthetisch darzustellen, waren die Formeln der einzelnen Verbindungen endgültig festgelegt.

Im Verlaufe der vorliegenden Untersuchungen gelang es nun, die entsprechende Verbindung der Haematoxylinreihe, das Tetramethylallohaematoxylin, darzustellen und seine Eigenschaften mit denen des Trimethylallobrafilins zu vergleichen. Beim Behandeln von Tetramethylhaematoxylin mit Natriumamalgam in eisessigsaurer Lösung entstand in 60prozentiger Ausbeute ein Reduktionsprodukt von der Zusammensetzung $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_6$, das aus Alkohol in farblosen derben Prismen vom Schmelzpunkt 150° kristallisierte und sich in conc. Schwefelsäure mit blutroter Farbe und gleichem Ablauf löste. Der Nachweis von aktivem Wasserstoff nach Zerewitinoff verlief negativ, ebenso gelang es nicht, mit Hydroxylamin und Senicarbazid eine Ketogruppe nachzuweisen; in beiden Fällen konnte das Ausgangsprodukt zurückerhalten werden. In diesen beiden Eigenschaften stimmt also das Verhalten unseres Reduktionsproduktes mit dem des Trimethylallobrafilins überein, sodaß es nahe liegt, ihm folgende Konstitutionsformel zu erteilen:



und stützt seine Formulierung des Acetylderivates vor allem auf dessen Eigenschaft, durch Kaliumpermanganat schlagartig oxydiert zu werden, was das Vorhandensein einer Doppelbindung im Molekül sehr wahrscheinlich macht.

Die große Widerstandsfähigkeit des Tetramethylallohaematoxylyns gegenüber Acetylierungsmitteln (alle Versuche lieferten stets das unzeretzte Ausgangsprodukt zurück) zeigt, daß im Haematoxylderivat der sauerstoffhaltige Siebenering sehr stabilisiert ist, was wir auf die Methoxylgruppe in Nachbarstellung zum Brücken-sauerstoffatom zurückführen müssen.

Die reduktive Aufspaltung des Tetramethyl-allohaematoxylyns an den beiden Ring-sauerstoffatomen wurde unter den verschiedensten Bedingungen versucht¹⁾. Trotz der Verwendung verschiedenartiger Katalysatoren, selbst beim Arbeiten unter Druck und bei höherer Temperatur gelang es nicht, das Molekül in dieser Weise zu spalten. Der Mißerfolg der bisherigen Versuche hat wahrscheinlich ebenfalls seinen Grund in der dem Ring-sauerstoffatom benachbarten Methoxylgruppe.

Im Einklang mit den Beobachtungen am Trimethylallobrafilin erwies sich auch das Tetramethyl-allobrafilin als äußerst widerstandsfähig gegen Oxydationsmittel. Erst ein längeres Einwirken von Chromsäure oder Wasserstoffperoxyd in der Wärme ergab einen völligen Abbau des Moleküls, führte aber zu nicht kristallisierenden, uneinheitlichen Produkten.

1) Unter normalen Bedingungen konnte stets das Ausgangsprodukt zurückerhalten werden. Bei höherer Temperatur und beim Arbeiten unter Druck entstanden dagegen amorphe Produkte, die sich zwar in Alkali lösen und mit conc. H_2SO_4 keine Halochromie mehr zeigten, aber nie kristallisiert zu erhalten waren.

Die Einwirkung von conc. Schwefelsäure und Chlorwasserstoff auf Tetramethyl-allohaematoxylin geht erst bei höherer Temperatur und nach längerer Reaktionsdauer vor sich. Es entstehen tief-farbige, alkalilösliche Produkte, die aber aus keinem Lösungsmittel kristallin zu erhalten sind. Die tiefe Farbe dieser Verbindungen ist wohl auf eine Bildung von chinoiden Substanzen zurückzuführen.

Wie schon im Kapitel II näher dargelegt worden ist, besteht für die Körperklasse der cyclischen Aether, die vom Chromindan-skelett abstammen, die Möglichkeit des Auftretens stereoisomerer cis-trans-Formen. In der Tat gelang es P. Pfeiffer und P. Schneider ¹⁾, das Trimethyl-allobrafilin in zwei Formen zu isolieren, die sich zwar in ihrer Kristallform und ihrem Schmelzpunkt deutlich unterscheiden, jedoch in ihrem chemischen Verhalten einander derart ähnlich sind, daß sie nur Stereoisomer zueinander sein können (siehe S. 26). Die höher schmelzende (F: 135°), stabilere Form wurde als α -Form, die tiefer schmelzende (F: 121°) als β -Form bezeichnet.

In Analogie hierzu gelang es nun, das weiter oben näher beschriebene Tetramethyl-allohaematoxylin durch Phosphorpentoxyd in eine Stereoisomere Form umzulagern. Diese bildet aus Anisol farblose Nadeln vom Schmelzpunkt 166°, die sich in conc. Schwefelsäure mit blutroter Farbe lösen und mit der tiefer schmelzenden Form des Tetramethyl-allohaematoxylin (F. 150°) eine deutliche Depression ergeben. In chemischer Beziehung stimmen beide Formen weitgehend überein; wir wollen daher auch hier die höher schmelzende Form als die α -Form, die tiefer schmelzende als die β -Form bezeichnen. Welche von ihnen der cis- und welche der trans-Reihe angehört, läßt sich heute noch nicht entscheiden.

Im Folgenden sind die Eigenschaften der Stereoisomeren Formen beider Reihen systematisch zusammengestellt:

1) P. Pfeiffer und P. Schneider, Journ. 140, 14 (1934).

	Schmelzpunkt	Lösungsfarbe in conc. Schwefels.	Eigenschaften
α -Tetramethyl-allohaematoxylin	166°	blutrot	Gibt kein Oxim und kein Acetylderivat. Stabile Form; läßt sich nicht umlagern.
β -Tetramethyl-allohaematoxylin	150°	blutrot	Gibt kein Oxim und kein Acetylderivat. Instabile Form; läßt sich mit P_2O_5 in die α -Form umlagern.
γ -Trimethyl-allobrasilin	135°	blutrot	Gibt kein Oxim, dagegen eine Acetylverbindung. Stabile Form; läßt sich nicht umlagern.
δ -Trimethyl-allobrasilin	121°	blutrot	Gibt kein Oxim; mit Essigsäureanhydrid entsteht die Acetylverbindung der α -Form. Instabile Form; läßt sich mit Alkali in die α -Form umlagern.

Wie schon von P. Pfeiffer¹⁾ bei seinen Untersuchungen über die Konstitution des Trimethyl-allobrasilins erwähnt wurde, kann man die cyclischen Aether der Brasilin- bzw. Haematoxylinreihe in gewisser Hinsicht mit dem Cineol vergleichen, in welchem die beiden Kohlenstoffatom 1 und 8 durch eine Sauerstoffbrücke ätherartig mit einander verknüpft sind. Ihm kommt, wie schon lange bekannt ist²⁾, ein großes Additionsvermögen zu, indem es sich mit organischen Verbindungen (Phenolen und deren Abkömmlinge, aromatischen Oxy Säuren und deren Estern usw.), vor allem aber auch mit anorganischen Säuren, wie HCl , HBr , HJ , H_3PO_4 , H_3AsO_4 , Ferro- und Ferricyanwasserstoffsäure, u. a. m. zu gut kristallisierenden Verbindungen vereinigt. Die Vermutung lag nun

1) Journ. 140, 14 (1934).

2) Beilstein, 4. Aufl. Bd. XVII, S. 26; ebenda 4. Aufl. Erg.-Bd. XVIII—XIX, S. 16,

nahe, daß Trimethyl-allohaematoxylin als cyklischer Aether ebenfalls das Bestreben zeigen würde, derartige Molekülverbindungen zu bilden, die zur näheren Charakterisierung dieser Körperklasse dienen konnten. Die zunächst am α -Trimethylallobrafilin und β -Tetramethyl-allohaematoxylin angestellten Versuche, mit Hilfe der Festlegung von Taupunkts- und Schmelzpunktskurven²⁾ festzustellen, ob diese Aether überhaupt fähig sind, Molekülverbindungen zu bilden, ergaben Kurvenbilder, die eindeutig auf deren Nichtexistenz hinwiesen.

Dagegen gelang es beim α -Tetramethyl-allohaematoxylin einige Molekülverbindungen darzustellen:


Beim Versuch, die α -Form des Tetramethyl-allohaematoxylin, die wir aus Anisol rein erhalten hatten, aus Alkohol umzukristallisieren, bildeten sich feine farblose Nadelchen von der Zusammensetzung $2 (C_{20}H_{22}O_6) \cdot C_2H_5OH$, die die gleiche Lösungsfarbe in conc. Schwefelsäure wie die reine α -Form hatten. Beim Erhitzen zeigten sie keinen einheitlichen Schmelzpunkt, zersetzten sich vielmehr zwischen 125 und 132° unter Gasentwicklung. In gleicher Weise konnte durch Lösen der reinen α -Form in Benzol und langsames Verdunstenlassen des Lösungsmittels eine Additionsverbindung von der Zusammensetzung $5 (C_{20}H_{22}O_6) \cdot C_6H_6$ in Form farbloser Nadeln isoliert werden; sie zersetzten sich bei 132 bis 138° unter Auffäumen. Außerdem vermag sich das α -Tetramethyl-allohaematoxylin mit Aether, Chloroform, Aceton, Pyridin usw. zu vereinigen. Beim vorsichtigen Erhitzen im Vakuum wird das addierte Lösungsmittel stets wieder abgegeben, und es hinterbleibt das reine Tetramethyl-allohaematoxylin vom Schmelzpunkt 166° .

1) H. Rheinboldt, Bonn. Die Bestimmung organischer Molekülverbindungen mit Hilfe der thermischen Analyse. Siehe Houben: Methoden d. org. Chemie, 3. Aufl. Bd. I, S. 1169 ff.

Praktischer Teil.

I. Darstellung des Tetramethylhaematoxylin und des Tetramethylhaematoxylons:

1. Tetramethylhaematoxylin (5-Oxy, 1,2,10,11- tetramethoxychromindan. ¹⁾)




Die bekannte Vorchrift zur Darstellung des Tetramethylhaematoxylin wurde dahingehend abgeändert, daß die Methylierung in alkalischem Medium begonnen wurde. Als Lösungsmittel wurde Methylalkohol verwandt, da die Methylierung bei der Siedetemperatur des Aethylalkohols leicht zu einer Verharzung des Reduktionsproduktes führt. Unter den angeführten Bedingungen ließen sich bequem größere Mengen des Methyläthers (bis zu 100 g auf einmal) in quantitativer Ausbeute darstellen: •

50 g Haematoxylin werden in einem großen Rundkolben in 200 ccm Methylalkohol gelöst und die Lösung zum Sieden erhitzt. Zur siedenden Lösung wird nun auf einmal eine größere Portion (ca. 20 ccm) einer heißen 50prozentigen Kalilauge gegeben, wobei sich das Reaktionsgemisch blaurot färbt. Bei der Zugabe von etwa der gleichen Menge Dimethylsulfat setzt die Reaktion unter starkem Auffäumen ein. Sobald Dimethylsulfat im Überschuß vorhanden ist, färbt sich das nunmehr saure Reaktionsgemisch gelb. Es wird dann wieder alkalisch gemacht und portionenweise soviel Dimethylsulfat zugegeben, daß die Lösung wieder sauer reagiert. (Auf diese Weise hat man die Reaktion dauernd in der Hand, sie verläuft nicht auf einmal, sondern stufenweise, außerdem verringert sich die Menge des anzuwendenden Dimethylsulfats auf fast

¹⁾ Perkin, Soc. 81, 1059 (1902).

die Hälfte der in der Literatur angegebenen Mengenverhältnisse.) Gegen Ende der Reaktion kann man ein deutliches Aufhellen der Lösungsfarbe im alkalischen Medium beobachten; ein weiteres Methylieren der nur noch schwach rosa gefärbten Lösung ist nutzlos. Das siedend heiße Reaktionsgemisch wird nun rasch in die 12 bis 15fache Menge Eiswasser eingerührt, wobei der Methyläther in schwach rötlich gefärbten Kristallen ausfällt. Das nach 12stündigem Stehen abgefaugte und getrocknete Rohprodukt kann direkt weiter zum Diketon verarbeitet werden. Aus Alkohol bildet der Methyläther farblose große Kristalle vom Schmelzpunkt 142° . Lösungs-
farbe in conc. Schwefelsäure: orangegelb mit fast farblosem Ablauf. Ausbeute an Rohprodukt: 62 g.

2. Tetramethylhaematoxylon (1,2,10,11-Tetramethoxy- lyo-chromindandion-(5,6). ¹⁾



10 g Tetramethylhaematoxylin (Rohprodukt) werden in 50 ccm heißem Eisessig gelöst und nach dem Abkühlen auf 10° in kleinen Portionen mit einer Lösung von 6 g Chromsäure in möglichst wenig Wasser versetzt, wobei die Reaktionstemperatur durch Eiskühlung auf $10-15^{\circ}$ gehalten wird. Nach einstündigem Stehen bei dieser Temperatur wird mit der 5fachen Menge Eiswasser verdünnt und der im Laufe von 12 Stunden ausgefallene Niederschlag von strohgelben Kriställchen abgefaugt. Nach einmaligem Umkristallisieren aus Eisessig bildet er farblose Kristallnadelchen, die sich bei $192-196^{\circ}$ unter Braunfärben zersetzen. Halochromie in conc. Schwefelsäure: orangegelb mit gleichem Ablauf. Ausbeute an einmal umkristallisierter Substanz: 5,8 g.

II. Reproduktionsprodukte der μ -Oxytetramethyl- haematoxylinreihe.

Die Reduktionsversuche am Tetramethylhaematoxylon unter sehr milden Bedingungen, in einer 5prozentigen alkoholischen Eisessiglösung mit Zinkstaub, führten zu drei verschiedenen Reduk-

1) Perkin, Soc. 81, 1060 (1902).

tionsprodukten, dem μ -Oxytetramethylhaematoxylin, dem α -Tetramethylhaematoxylopinakon und dem Tetramethylhaematoxylonol. Dabei zeigte sich, daß die Ausbeute an diesen drei nebeneinander entstehenden Reduktionsprodukten sehr stark abhängig ist von der Konzentration des Eisessigs im Reaktionsgemisch. Das im folgenden beschriebene Verfahren ergab das μ -Oxytetramethylhaematoxylin in einer Ausbeute bis zu 30%.

1. Reduktion des Tetramethylhaematoxylons mit Zinkstaub und Eisessig.

3 g feingepulvertes Tetramethylhaematoxylon wurden in 300 ccm Alkohol und 15 ccm Eisessig aufgeschlämmt und mit einem großen Überschuß an Zinkstaub in einer gut verschlossenen Flasche etwa 65—70 Stunden bei Zimmertemperatur geschüttelt. Das vom überschüssigen Zink und unzeretzten Diketon befreite Filtrat wurde mit der 2—3fachen Menge Wasser verdünnt und bei 40° im Vakuum stark eingengt. Der dabei ausgefallene, schwach gelblich gefärbte Niederschlag wurde abfiltriert, gut mit heißem Wasser gewaschen und getrocknet. (Ausbeute 1,6 g pro Ansatz.) Das Rohprodukt wurde einige Male mit wenig heißem Alkohol ausgezogen, wobei ein Teil ungelöst zurückblieb (Fraktion I). Aus dem alkoholischen Filtrat schieden sich beim Abkühlen farblose Kristalle aus. (Fraktion II.) Die Mutterlauge enthielt stets neben einer weiteren Menge der Fraktion II noch in sehr geringen Mengen farblose Nadelchen einer dritten Fraktion III. Das Mengenverhältnis der drei Fraktionen war stets wechselnd, vor allem stieg die Ausbeute an Fraktion I bei der Anwendung von mehr Eisessig.

Die erste Fraktion wurde in wenig heißem Pyridin gelöst und die Lösung mit Alkohol bis zur schwachen Trübung versetzt. Nach längerem Stehen schieden sich farblose, große Kristalle ab, die sich bei 285—287° unter vorausgehender Braunfärbung zersetzten und sich in conc. Schwefelsäure primär mit tannengrüner Farbe, die rasch in ein schmutziges Braungelb überging, lösten. Ein Mischschmelzpunkt mit α -Tetramethylhaematoxylopinakon (F: 287°) ergab keine Depression. Die III. Fraktion bildete nach zweimaligem Umkristallisieren aus wenig heißem Alkohol farblose Nadeln vom Schmelzpunkt 188°, die sich durch ihre Lösungsfarbe in conc. Schwefelsäure (rotviolett mit rein blauem Ab-

lauf) und ihren Mischschmelzpunkt mit Tetramethylhaematoxylinol als identisch mit diesem erwiesen.

2. μ -Oxytetramethylhaematoxylin (5,6-Dioxy-1,2,10,11-tetramethoxychromindan).



Das bei der Reduktion in 5prozentiger eiseffigsaurer Lösung in überwiegender Menge entstandene Rohprodukt II bildete nach zweimaligem Umkristallisieren aus absolutem Alkohol farblose rhomboedrische Kristalle, die bei 192° sinterten und bei 194° scharf durchschmolzen. Die Lösungsfarbe in conc. Schwefelsäure war primär tiefrot; nach einigem Stehen, noch rascher vor allem beim Erwärmen, ging sie in hellgelb mit einer schwachen grünlichen Fluorescenz über. In conc. Salzsäure war die Lösungsfarbe dunkelrot, in Ameisensäure carminrot und wesentlich beständiger als in conc. Schwefelsäure. Die Analyse der bei 80° im Vakuum getrockneten Substanz zeigte, daß ein Monooxyderivat des tetramethylierten Haematoxylics $\text{C}_{20}\text{H}_{21}\text{O}_6 \cdot (\text{OH})$ vorlag:

5,005 mg gaben 11,770 mg CO_2 und 2,700 mg H_2O .

gefunden:

64,14% C; 6,03% H.

ber. für $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_7$:

64,14% C; 5,92% H.

Das μ -Oxytetramethylhaematoxylin erwies sich als außerordentlich beständig gegen Alkali; selbst beim achtfündigen Kochen seiner conc. alkoholischen Lösung mit festem Kaliumhydroxyd wurde das unveränderte Ausgangsprodukt zurückerhalten.


3. Konstitutionsermittlung am μ -Oxytetramethylhaematoxylin:

a) Oxydation zum Tetramethylhaematoxylin:


0,5 μ -Oxytetramethylhaematoxylin wurden in 15 ccm Eiseffig gelöst und tropfenweise mit einer conc. wäßrigen Lösung von 0,25 g Chromsäure versetzt. Nach dreistündigem Stehen wurde kurze Zeit auf dem Wasserbad erwärmt und die Lösung nach dem Erkalten mit der etwa zehnfachen Menge Wasser verdünnt. Nach längerem Stehen schied sich ein gelb gefärbter Niederschlag aus, der abfiltriert, getrocknet und aus Eiseffig umkristallisiert, farblose Nadeln bildete, die sich bei $192-196^\circ$ unter Braunfärbung zersetzten.

Ein Mischschmelzpunkt mit Tetramethylhaematoxylon (F: 192 bis 196°), sowie die orangegelbe Löfungsfarbe in conc. Schwefelfäure zeigten eindeutig die Identität des Oxydationsproduktes mit dem Diketon.

b) Acetonkondensationsprodukt von μ -Oxytetramethylhaematoxylin:



0,5 g μ -Oxytetramethylhaematoxylin wurden in 50 ccm wasserfreiem Aceton gelöst und 1—2 Tropfen conc. Salzfäure hinzugefügt. Beim langfamen Verdunften des Löfungsmittels fchieden sich fchwach rötlich gefärbte Kristallkrusten ab, die auf Ton über Natronkalk getrocknet wurden. Nach zweimaligem Umkristallisieren aus Alkohol bildeten sie farblose, zu Roletten vereinigte Nadelchen, die bei 157° fcharf durchfchmolzen und mit dem Ausgangsprodukt eine deutliche Depreffion ergaben. Die Löfungsfarbe in conc. Schwefelfäure war tiefrot wie die des freien Oxykörpers. Eine qualitative Probe auf Halogen war negativ; dagegen bildete das Kondensationsprodukt mit Schwefelfäure, Salzfäure und Überchlorfäure tiefrot gefärbte Salze. Die Analyse zeigte, daß ein Cycloacetalderivat von der Summenformel:



vorlag: 5,289 mg der bei Zimmertemperatur im Vakuum getrockneten Substanz ergaben 12,925 mg CO_2 und 2,960 mg H_2O :

gefunden:	66,66% C; 6,26% H.
ber. für $\text{C}_{23}\text{H}_{26}\text{O}_7$:	66,64% C; 6,32% H.

c) Versuche zur Acetylierung und Benzoylierung von μ -Oxytetramethylhaematoxylin:

0,5 g μ -Oxytetramethylhaematoxylin wurden in wenig Pyridin gelöst und mit 0,5 g Essigfäureanhydrid auf dem Wasserbad erwärmt. Nach dem Erkalten wurde mit wässerigem Ammoniak verdünnt und der ausgefallene, fast farblose Niederschlag aus wenig Alkohol umkristallisiert. Er bildete die charakteristischen Rhomboeder des Ausgangsproduktes vom Schmelzpunkt 194°. Ein wei-

terer Acetylierungsversuch mit Thioessigsäure ergab ebenfalls das unveränderte Ausgangsprodukt zurück. Die Einwirkung von Acetylchlorid auf den Oxykörper in Pyridinlösung führte schon in der Kälte zu einem harzartigen Produkt, an dem alle Kristallisationsversuche scheiterten.

0,5 g des Oxykörpers wurden mit der gleichen Gewichtsmenge Benzoylchlorid in wenig Pyridin gelöst und längere Zeit auf dem Wasserbad erwärmt. Aus der mit wässrigem Ammoniak verdünnten Lösung schied sich ein gelblich gefärbter Niederschlag ab, der sich nach einmaligem Umkristallisieren als das unveränderte Ausgangsprodukt erwies. Ein zweiter Versuch mit 3,5-Dinitrobenzoylchlorid war ebenfalls ohne Erfolg, beim Aufarbeiten konnte fast quantitativ das Ausgangsprodukt wieder zurückerhalten werden.

4. Salze des μ -Oxytetramethylhaematoxylin:

a) μ -Oxytetramethylhaematoxylin-chlorid:



Zu einer Aufschlammung von 0,1 g reinem μ -Oxytetramethylhaematoxylin in wenigen Tropfen Alkohol oder Aceton wurden 2—3 Tropfen rauchender Salzsäure hinzugefügt und dann solange schwach erwärmt, bis alles in Lösung gegangen war. Die tiefrote Lösung wurde rasch filtriert; nach einigem Stehen schied sich im Vakuum das Chlorid in tiefroten Nadeln ab, die auf Ton abgepreßt und über Natronkalk getrocknet wurden. Die Analyse des so getrockneten Salzes ergab folgende Werte:

1) 4,455 mg gaben 9,750 mg CO_2 und 2,230 mg H_2O .

13,750 mg gaben 4,800 mg AgCl .

gefunden: 59,68% C; 5,62% H; 8,88% Cl.

ber. für 2 $(\text{C}_{20}\text{H}_{21}\text{O}_6) \text{Cl} \cdot \text{H}_2\text{O}$: 59,78% C; 5,52% H; 8,83% Cl.

Durch vorsichtiges Trocknen im Vakuum bei 45° gelang es, das überschüssige Wasser zu entfernen:

2) 4,901 mg gaben 10,960 mg CO_2 und 2,350 mg H_2O ,

16,332 mg gaben 5,770 mg AgCl .


gefunden: 60,99% C; 5,36% H; 8,74% Cl.

ber. für $\text{C}_{20}\text{H}_{21}\text{O}_6) \text{Cl}$: 61,13% C; 5,39% H; 9,03% Cl.

Gegen Wasser erwies sich das Chlorid als sehr unbeständig; es wurde momentan entfärbt, ohne in Lösung zu gehen. Gegen Alkohol war es wesentlich beständiger, ebenso gegen Benzol und Aceton, erst beim Erwärmen ging es unter Verschwinden der tiefroten Farbe in Lösung. In heißem Eisessig löste es sich zunächst tiefrot, nach einigem Stehen oder nach Zusatz einiger Tropfen Wasser verschwand die Farbe. Vollkommen unlöslich und auch hydrolysenbeständig war es in wasserfreiem Aether.

0,1 g μ -Oxytetramethylhaematoxylinchlorid wurden einige Minuten mit 20 ccm einer wässrigen 10prozentigen Ammoniaklösung durchgeschüttelt. Das so erhaltene fast farblose Rohprodukt bildete, aus wenig heißem Alkohol umkristallisiert, die charakteristischen rhomboedrischen Kristalle des μ -Oxytetramethylhaematoxylin vom Schmelzpunkt 194° .

b) μ -Oxytetramethylhaematoxylin-bromid:



0,1 g μ -Oxytetramethylhaematoxylin wurden in wenigen Tropfen Alkohol aufgeschlämmt und einige Tropfen einer wässrigen Bromwasserstoffsäurelösung (d: 1,38) hinzugefügt. Nach einigem Stehen wurden die tiefrot gefärbten Kristallnadeln des Bromids auf Ton gebracht und im Vakuum über Natronkalk längere Zeit getrocknet. Die Analyse des so getrockneten Salzes ergab:

4,942 mg gaben 9,925 mg CO_2 und 2,220 mg H_2O ,

5,040 mg gaben 2,180 mg AgBr.

gefunden: 54,77% C; 4,98% H; 18,40% Br

ber. für $\text{C}_{20}\text{H}_{21}\text{O}_6 \cdot \text{Br}$: 55,05% C; 4,84% H; 18,29% Br.

Mit verdünnter wässriger Ammoniaklösung ließ sich das Bromid momentan in feine Pseudobase, das μ -Oxytetramethylhaematoxylin, zurückverwandeln: 0,05 g des Bromids wurden mit einer 10prozentigen wässrigen Ammoniaklösung kurze Zeit geschüttelt, das fast farblose Rohprodukt abgefaugt und aus wenig heißem Alkohol umkristallisiert. Es bildete farblose rhomboedrische Kristalle vom Schmelzpunkt 194° (Mischschmelzpunkt mit μ -Oxytetramethylhaematoxylin: $193-194^{\circ}$.)

c) μ -Oxytetramethylhaematoxylin-jodid:



Zu einer Aufschlammung von 0,1 g μ -Oxytetramethylhaematoxylin in wenig eiskaltem Alkohol wurden einige Tropfen einer 48prozentigen wäßrigen Jodwasserstofflösung gegeben. Das Reaktionsgemisch erstarrte augenblicklich zu einem tiefrot gefärbten Kristallbrei, der sofort auf Ton gebracht und im Vakuum über Natronkalk getrocknet wurde.

4,708 mg des nach 2 Tagen analysierten, lufttrockenen Salzes ergaben: 8,585 mg CO_2 und 1,940 mg H_2O ,

10,300 mg der gleichen Probe gaben: 4,930 mg AgJ.

gefunden: 49,73 % C; 4,63 % H; 25,89 % J

ber. für $\text{C}_{20}\text{H}_{21}\text{O}_6) \text{J}$: 49,59 % C; 4,37 % H; 26,22 % J.

0,05 g des Jodids wurden mit einer 10prozentigen wäßrigen Ammoniaklösung geschüttelt, bis Entfärbung eingetreten war. Das schwach gelblich gefärbte Rohprodukt bildete aus wenig heißem Alkohol die charakteristischen Romboeder des μ -Oxytetramethylhaematoxylin vom Schmelzpunkt 194° . —

Die Beständigkeit des Jodids scheint jedoch nicht sehr groß zu sein. Schon nach wenigen Tagen nahmen die Kristalle eine schwarzgrüne Färbung an, während das Chlorid und Bromid noch nach wochenlangem Aufbewahren denselben tiefroten Farbton zeigten. Eine kleine Probe des dunkelgefärbten Jodids ließ sich nicht mehr in das μ -Oxytetramethylhaematoxylin zurückverwandeln. Sie bildete beim Behandeln mit Ammoniak eine dunkelbraune amorphe Masse, die sich in conc. Schwefelsäure mit schmutzig-braunroter Farbe löste und aus Alkohol nicht kristallin zu erhalten war.

d) μ -Oxytetramethylhaematoxylin-sulfat:



0,1 g μ -Oxytetramethylhaematoxylin wurden in so viel Alkohol aufgeschlammmt, daß in der Siedehitze eben alles in Lösung ging und die noch heiße Lösung mit einigen Tropfen conc. Schwefelsäure versetzt. Beim Abkühlen schieden sich aus der tiefrot gefärbten Lösung die dunkelroten langen Nadeln des Sulfats ab. Zur Analyse wurde das Salz bei 45° im Vakuum zur Gewichtskonstanz getrocknet und ergab folgende Werte:

5,101 mg gaben 9,865 mg CO₂ und 2,200 mg H₂O,

9,300 mg gaben 4,745 mg BaSO₄.

gefunden:

52,87% C; 4,83% H; 7,01% S

ber. für C₂₀H₂₁O₆)SO₄H:

52,84% C; 4,88% H; 7,06% S.

Das Sulfat war wesentlich hydrolysenbeständiger als die Halide. Es löste sich viel schwerer in heißem Benzol, Alkohol und Aceton, wobei die Entfärbung wesentlich langsamer eintrat. Die Lösungsfarbe in Eisessig war tiefrot und verschwand erst bei starkem Erwärmen.

0,1 g des Sulfats wurden mit einer 10prozentigen wäßrigen Ammoniaklösung so lange geschüttelt, bis vollständige Entfärbung eingetreten war. Das farblose Rohprodukt ergab beim Umkristallisieren aus wenig heißem Alkohol das μ -Oxytetramethylhaematoxylin vom Schmelzpunkt 194° zurück.

e) μ -Oxytetramethylhaematoxylin-perchlorat:



Zu einer heißen alkoholischen Lösung von 0,1 g μ -Oxytetramethylhaematoxylin wurden einige Tropfen einer 70-prozentigen wäßrigen Überchlorssäure gegeben. Aus der tiefrot gefärbten Lösung schied sich das Perchlorat momentan in langen dunkelroten Nadeln ab, die im Exsiccator über Natronkalk getrocknet wurden.

11,423 mg des lufttrockenen Salzes ergaben 3,568 mg AgCl.

gefunden:


7,72% Cl

ber. für C₂₀H₂₁O₆)ClO₄:

7,76% Cl.

Das Perchlorat erwies sich als das hydrolysenbeständigste aller dargestellten Salze. Erst nach längerem Schütteln mit 10-prozentigem wäßrigem Ammoniak war es vollkommen entfärbt und zeigte dann nach einmaligem Umkristallisieren aus Alkohol den Schmelzpunkt 194° des μ -Oxytetramethylhaematoxylin.

f) Tetramethylisohaemateinsulfat:



0,1 g μ -Oxytetramethylhaematoxylin wurden in wenig conc. Schwefelsäure unter gelindem Erwärmen gelöst. Nachdem die zunächst dunkelrote Farbe der Flüssigkeit verschwunden war, wurde die orangegelbe Lösung auf Eis gegossen und der ausgefallene orange-

rote Niederschlag nach einigem Stehen abfiltriert und getrocknet. Er bildete, aus wenig heißem Eisessig umkristallisiert, lange ineinander verzweigte orangefarbene Nadelchen, die sich im Gegensatz zu dem roten Sulfat spielend leicht in Wasser lösten. Die sehr verdünnte wässrige Lösung zeigte eine schwache grüne Fluoreszenz. Die Analyse zeigte, daß hier das von Engels, Perkin und Robinson¹⁾ aus Pentamethyldihydrohaemateinol mit conc. Schwefelsäure erhaltene Tetramethylisohaemateinsulfat vorlag:

4,901 mg der bei 80° im Vakuum getrockneten Substanz gaben
 9,428 mg gaben 5,140 mg BaSO₄.
 9,865 mg CO₂ und 2,060 mg H₂O,

gefunden: 54,89% C; 4,70% H; 7,48% S
 ber. für C₂₀H₁₈O₅ · SO₄H: 55,02% C; 4,62% H; 7,35% S.

Ein Versuch, das zum Isohämateinsalz gehörige Carbinol C₂₀H₁₈O₅OH aus dem Tetramethylisohaemateinsulfat darzustellen, hatte keinen Erfolg: 0,1 g Tetramethylisohaemateinsulfat wurden in wenig Wasser gelöst und die Lösung mit einigen Kubikzentimetern einer 10-prozentigen wässrigen Ammoniaklösung kurze Zeit auf dem Wasserbad erwärmt. Die gelb gefärbte Lösung wurde mehrmals mit wenig Benzol ausgezogen und die vereinigten Auszüge zur Trockne eingedunstet. Es hinterließ eine dunkelbraune, harzige Masse, an der alle Kristallisationsversuche scheiterten.

5. Reduktionsversuche am μ -Oxytetramethylhaematoxylin:

a) Reduktion zum Tetramethylanhydrohaematoxylin (1,2,10,11-Tetramethoxychrominden):



a) 1 g μ -Oxytetramethylhaematoxylin wurde in 20 ccm heißem Alkohol gelöst, mit 2—3 Tropfen conc. Salzsäure versetzt und eine gesättigte wässrige Lösung von 2 g Natriumhyposulfit in kleinen Portionen hinzugefügt. Die schwach gelb gefärbte Lösung wurde auf dem Wasserbad zwei Stunden erwärmt und nach dem Erkalten mit viel Wasser verdünnt. Nach längerem Stehen schied sich ein hellbrauner, amorpher Nieder-

1) Engels, Perkin und Robinson, Soc. 93, 1151.

schlag ab, der abgefaugt, getrocknet und aus wenig heißem Alkohol umkristallisiert wurde. Nach zweimaligem Umlösen in wenig heißem Alkohol bildete er schwach bräunlich gefärbte, grobe Nadeln, die sich bei 172—176° unter Dunkelfärbung zersetzten. Die Lösungs-
farbe in conc. Schwefelsäure war orangerot mit etwas hellerem Ab-
lauf. Die Analyse des 80° im Vakuum getrockneten Reduktions-
produktes entsprach der Summenformel: $C_{20}H_{20}O_5$:

5,055 mg gaben 13,075 mg CO_2 und 2,720 mg H_2O ,	
gefunden:	70,54% C; 6,02% H,
ber. für $C_{20}H_{20}O_5$:	70,58% C; 5,93% H.

Das auf diesem Weg erhaltene Reduktionsprodukt des μ -Oxytetramethylhaematoxylin erwies sich durch Mischschmelzpunkt und Lösungs-
farbe in conc. Schwefelsäure, sowie durch seine Analyse als vollkommen identisch mit dem, von Herzig und Pollak ¹⁾ durch Reduktion des Tetramethylhaematoxylin mit Phenylhydrazin erhaltenen Tetramethylanhydrohaematoxylin. Das Vergleichsprodukt wurde nach der Herzig'schen Vorschrift in einer Ausbeute von 65% dargestellt. Sein Zersetzungspunkt lag bei 170—176°.

β .) 0,5 g μ -Oxytetramethylhaematoxylin wurden in 20 ccm Eisessig gelöst, ein großer Überschuß von Zinkstaub hinzugefügt und das Ganze bei Wasserbadtemperatur tropfenweise mit 5 ccm conc. Salzsäure versetzt. Nach weiterem kurzen Erwärmen auf dem Wasserbad wurde mit viel Wasser verdünnt, mit Sodalösung neutralisiert und der ausgefallene Niederschlag aus wenig Alkohol umkristallisiert. Er bildete bräunliche Nadeln, die sich bei 170—175° unter Dunkelfärbung zersetzten; Mischschmelzpunkt und Lösungs-
farbe erwiesen die Identität des Reduktionsproduktes mit Tetramethylanhydrohaematoxylin.

γ .) 0,5 g μ -Oxytetramethylhaematoxylin wurden in wenig Essig-
säureanhydrid unter Erwärmen gelöst. Nach Zugabe von 2—3 g Zinkstaub wurde kurze Zeit zum Sieden erhitzt und das Reaktions-
gemisch, nach dem Entfernen des überschüssigen Zinks, auf dem Wasserbad mehrmals mit wasserfreiem Methanol abgedampft, bis alles Anhydrid zerstört war. Der Rückstand wurde mit Aceton auf-
genommen, das Ungelöste abgetrennt, und das Filtrat bis zur Trockne eingengt. Es hinterblieben stark verharzte Kristallkrusten,

1) Herzig und Pollak, B. 38, 294.

aus denen durch Behandeln mit wenig heißem Alkohol in geringer Menge bräunliche Nadeln isoliert werden konnten, die sich bei 170—178° zersetzen. Ein Mischschmelzpunkt mit Tetramethylanhydrohaematoxylin ergab keine Depression.

δ.) 0,5 g μ -Oxytetramethylhaematoxylinchlorid wurden in 20 ccm Eisessig gelöst und zu der tiefrot gefärbten Lösung bei Zimmertemperatur in kleinen Portionen 2 g Calciumhydrid gegeben. Gegen Ende der heftigen Wasserstoffentwicklung wurde kurz auf dem Wasserbad erwärmt und die nunmehr nur schwach gelb gefärbte Lösung mit Wasser verdünnt. Da sich, selbst nach längerem Stehen, kein Niederschlag abschied, wurde mehrmals mit Benzol ausgezogen, und die vereinigten, gut getrockneten benzolischen Auszüge eingedampft. Der dunkel gefärbte, harzige Rückstand bildete aus wenig heißem Alkohol beim langsamen Verdunsten des Lösungsmittels in geringer Menge farblose Nadeln, die sich bei 170 bis 177° zersetzen und mit Tetramethylanhydrohaematoxylin keine Depression ergaben.

*b) Reduktion zum Tetramethyldesoxyhaematoxylin
(1,2,10,11-Tetramethoxychromindan):*




1 g μ -Oxytetramethylhaematoxylin wurde in 100 ccm Eisessig gelöst und nach Zugabe von 0,2 g Pd/BaSO₄-Katalysator mit Wasserstoff geschüttelt. Nach 2 Stunden war die Wasserstoffaufnahme (122 ccm Wasserstoff, entsprechend 2 Mol. H₂) beendet. Das vom Katalysator abgetrennte Filtrat wurde mit wässriger Natriumcarbonatlösung neutralisiert. Nach längerem Stehen hatte sich ein schwach rötlich gefärbter Niederschlag abgeschieden, der, aus wenig Alkohol umkristallisiert, fast farblose Blättchen bildete, die bei 151° scharf durchschmolzen und sich in conc. Schwefelsäure mit schwach gelber Farbe und fast farblosem Ablauf lösten. Ein Mischschmelzpunkt mit dem Hydrierungsprodukt des Tetramethylanhydrohaematoxylin, dem Tetramethyldesoxyhaematoxylin (F: 151°), ergab keine Depression. Das zum Vergleich notwendige Tetramethyldesoxyhaematoxylin wurde nach den Angaben von Pfeiffer, Angern, Haack und Willems¹⁾

1) Pfeiffer, Angern, Haack und Willems, B. 61, 839 ff. (1928).

durch katalytische Reduktion des Tetramethylanhydrohaematoxy-
lins in fast quantitativer Ausbeute dargestellt.

Alle übrigen Reduktionsversuche am μ -Oxytetramethylhaema-
toxylin und feinen Salzen mit den verschiedensten Reduktions-
mitteln führten teils zu verharzten Produkten, teils lieferten sie
das unveränderte Oxyprodukt zurück (siehe Tabelle auf S. 46/47).

6. μ -Oxypentamethylhaematoxylin (5-Oxy-1,2,6,10,11- pentamethoxychromindan):



Durch Methylieren der im μ -Oxytetramethylhaematoxylin am
Kohlenstoffatom 6 befindlichen tertiären Hydroxylgruppe konnte
der dem Pentamethylhaematoxylin entsprechende Methyläther der
 μ -Oxyhaematoxylinreihe, das μ -Oxypentamethylhaema-
toxylin, erhalten werden. Sein Verhalten entsprach weitgehend
dem des μ -Oxytetramethylhaematoxylin; die Fähigkeit, mit Säuren
tiefgefärbte Salze zu bilden, bewies das Vorhandensein der sehr be-
weglichen Hydroxylgruppe am Kohlenstoffatom 5; sein oxydativer
Abbau zum Tetramethylhaematoxylin charakterisierte ihn als Ver-
treter der Chromindanreihe.

2 g μ -Oxytetramethylhaematoxylin wurden mit einigen Trop-
fen Alkohol angerieben und mit 1 g Kaliumhydroxyd auf dem
Wasserbad erwärmt. Nach etwa 1—2stündigem Kochen war alles in
Lösung gegangen. Zu dem hellgelb gefärbten, klarflüssigen Reak-
tionsgemisch, das beim Abkühlen vollkommen erstarrte, wurden in
der Kälte 2 g Jodmethyl gegeben, wobei die Reaktion unter Wär-
meentwicklung einsetzte. Nach 9—10stündigem Erwärmen auf dem
Wasserbad wurde das Reaktionsgemisch mit Eiswasser verdünnt.
Der sich zunächst ölig abscheidende Niederschlag wurde nach län-
gerem Stehen fest, sodaß er abgefaugt und im Vakuumexsiccator ge-
trocknet werden konnte. Das absolut trockene Rohprodukt wurde
in wenig heißem Alkohol gelöst und die Lösung mit der 3—4fachen
Menge Äther verdünnt. Nach längerem Stehen schieden sich fast
farbloße, dünne, quadratische Blättchen ab, die nach weiterem zwei-
maligem Umkristallisieren aus absolutem Alkohol bei 144° färbten
und bei 147° scharf durchschmolzen. Ihre Lösungsfarbe in conc.
Schwefelsäure war tiefrot mit gleichem Ablauf, sie entsprach ganz
der Lösungsfarbe des μ -Oxytetramethylhaematoxylin, war aber

wesentlich beständiger. Erst nach längerem Stehen und beim Erwärmen der Lösung ging sie in ein grünlichgelbes Gelb über, das bei sehr großer Verdünnung eine schwachgrünliche Fluoreszenz zeigte. In conc. Salzsäure und Ameisensäure lösten sich die Kristalle mit prächtiger carminroter Farbe, die sich selbst nach längerem Stehen nicht veränderte.

Die Analyse der bei 80° und 12 mm getrockneten Verbindung ergab folgende Werte:

4,612 mg gaben 10,985 mg CO₂ und 2,560 mg H₂O.

3,494 mg gaben zur CH₃O-Bestimmung 10,365 mg AgJ.

gefunden: 64,96% C; 6,21% H; 39,31% CH₃O

ber. für C₂₁H₂₄O₇: 64,92% C; 6,23% H; 39,96% CH₃O.

7. Oxydation des μ -Oxypentamethylhaematoxylin zum Tetramethylhaematoxylon:

0,5 g μ -Oxypentamethylhaematoxylin, gelöst in 5 ccm Eisessig, wurden bei Zimmertemperatur mit einer conc. wässrigen Lösung von 500 mg Chromsäure versetzt. Nach 12stündigem Stehen wurde mit der 4—5fachen Menge Wasser verdünnt und der ausgefallene gelblich gefärbte Niederschlag abgeseigt. Nach dem Umkristallisieren aus Eisessig bildete er farblose Nadelchen, die sich in conc. Schwefelsäure mit orangegelber Farbe lösten und sich bei 190—196° unter vorausgehender Braunfärbung zersetzten. Ein Mischschmelzpunkt mit Tetramethylhaematoxylon erwies die Identität des Oxydationsproduktes mit dem Diketon.

8. Salze des μ -Oxypentamethylhaematoxylin:

a) μ -Oxypentamethylhaematoxylin-chlorid:



0,5 g μ -Oxypentamethylhaematoxylin wurden in wenigen Tropfen heißen Alkohols gelöst und die Lösung mit 2—3 Tropfen rauchender Salzsäure versetzt. Aus der tiefrot gefärbten Flüssigkeit schieden sich nach kurzer Zeit dunkelrote Nadelchen mit grünem Oberflächenglanz ab, die auf Ton abgepreßt und im Vakuum exsiccator über Natronkalk getrocknet wurden. Die Analysen des auf diese Weise getrockneten Chlorids zeigten, daß die Zusammensetzung

wechselnd ist; das normale Chlorid vermag neben Wasser noch überschüssigen Chlorwasserstoff anzulagern.

1) 7,338 mg des lufttrockenen Chlorids ergaben 4,115 mg AgCl.
 3,229 mg des lufttrockenen Chlorids ergaben 7,435 mg AgJ.
 gefunden: 13,87% Cl; 30,42% CH_3O ;
 ber. für $\text{C}_{21}\text{H}_{23}\text{O}_6\text{Cl} \cdot \text{HCl} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$: 14,09% Cl; 30,12% CH_3O .

2.) 4,734 mg des lufttrockenen Chlorids ergaben 9,600 mg CO_2
 und 2,570 mg H_2O .
 14,240 mg lufttrockenen Chlorids ergaben 5,820 mg AgCl.
 3,318 mg des lufttrockenen Chlorids ergaben 8,460 mg AgJ.

gefunden: 55,51% C; 5,93% H; 10,09% Cl; 33,98% CH_3O
 ber. für 4 $\text{C}_{21}\text{H}_{23}\text{O}_6\text{Cl} \cdot \text{HCl} \cdot 8\text{H}_2\text{O}$:
 55,77% C; 5,64% H; 9,82% Cl; 34,23% CH_3O .

Durch vorsichtiges Trocknen bei 45° und 12 mm Druck gelang es zwar, den überschüssigen Chlorwasserstoff zu entfernen; das wasserfreie Chlorid dagegen darzustellen, gelang nicht, da bei höherer Temperatur eine komplizierte Zersetzung eintrat:

3) 0,1835 g lufttrockenes Chlorid verloren beim Trocknen bei 45° und 12 mm bis zur Konstanz 0,0038 g an Gewicht;
 gefunden: 2,07% Gewichtsverlust,
 ber. für eine Abspaltung von 1 HCl. aus:
 4 $\text{C}_{21}\text{H}_{23}\text{O}_6\text{Cl} \cdot 8\text{H}_2\text{O} \cdot \text{HCl}$: 2,02% Gewichtsverlust.

4) 4,7656 mg des bei 45° und 12 mm zur Konstanz getrockneten Chlorids ergaben: 9,915 mg CO_2 und 2,510 mg H_2O ;
 13,335 mg ergaben: 4,535 mg AgCl.
 gefunden: — 56,86% C; 5,90% H; 84,1% Cl.
 ber. für $\text{C}_{21}\text{H}_{23}\text{O}_6\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: 56,93% C; 5,70% H; 8,1% Cl.

Gegen Wasser erwies sich das Chlorid als sehr unbeständig; es wurde augenblicklich entfärbt, ohne in Lösung zu gehen. Dagegen war es in Alkohol, Benzol und wasserfreiem Aceton wesentlich beständiger; beim Erwärmen erst ging es unter Verschwinden der tiefroten Farbe in Lösung. Vollkommen unlöslich und sehr hydrolysenbeständig war es in wasserfreiem Äther.

Durch Hydrolyse des lufttrockenen, sowie des HCl-freien Chlorids konnte das freie Carbinol, das μ -Oxypentamethylhaematoxylin nahezu quantitativ zurückerhalten werden. Dagegen ergab die Hydrolyse des bei höherer Temperatur getrockneten Chlorids ein gelbgefärbtes, amorphes, zum Teil alkalilösliches Produkt, an dem alle Kristallisationsversuche scheiterten, ein Beweis für die tiefgehende Zersetzung, die das wasserhaltige Chlorid dann erleidet, wenn man es durch Erwärmen auf höhere Temperatur in den wasserfreien Zustand bringen will.

b) μ -Oxypentamethylhaematoxylin-bromid



Bei der Zugabe einiger Tropfen wässriger Bromwasserstoffsäure ($d = 1,38$) zu einer Aufschlammung von 0,2 g μ -Oxypentamethylhaematoxylin in wenig Alkohol erstarrte das Reaktionsgemisch augenblicklich zu einem Brei von dunkelrot gefärbten Kristallnadelchen, die, wie das Chlorid der Reihe, eine tiefgrüne messingglänzende Oberflächenfarbe zeigten. Auf Ton abgepreßt und längere Zeit im Vakuum über Natronkalk getrocknet, lieferten sie bei der Analyse folgende Werte:

- 1) 4,707 mg gaben 8,805 mg CO_2 und 2,170 mg H_2O ,
 9,690 mg gaben 4,920 mg AgBr,
 3,021 mg gaben zur CH_3O -Bestimmung: 7,250 mg AgJ;
 gefunden: 51,02% C; 5,15% H; 21,60% Br; 31,70% CH_3O ;
 ber. für 3 ($\text{C}_{21}\text{H}_{23}\text{O}_6$) Br. HBr. 3 H_2O :
 50,86% C; 5,08% H; 21,50% Br; 31,28% CH_3O .

- 2) 10,190 mg einer zweiten, nochmals dargestellten und wie oben getrockneten Probe ergaben 4,810 mg AgBr:
 gefunden: 20,09% Br
 ber. für 5 ($\text{C}_{21}\text{H}_{23}\text{O}_6$) Br. HBr. 5 H_2O : 19,84% Br.

Das Bromid vermag also, wie das Chlorid der Reihe, in wechselnden Verhältnissen überschüssigen Bromwasserstoff anzulagern, während die addierte Wassermenge konstant bleibt. Es gelang auch hier, durch vorsichtiges Trocknen bei 45° und 12 mm Druck den überschüssigen Bromwasserstoff zu entfernen:

- 3) 0,0872 g der Probe 1 verloren beim Trocknen bei 45° und 12 mm Druck 0,045 g an Gewicht:
 gefunden: 5,16% Gew.-Verlust,
 ber. für eine Abspaltung von HBr aus 3 (C₂₁H₂₃O₆) Br.
 HBr. 3 H₂O: 5,44% Gew.-Verlust.
- 4) 4,861 mg des bei 45° und 12 mm Druck getrockneten Bromids ergaben: 9,520 mg CO₂ und 2,410 mg H₂O.
 11,848 mg ergaben 4,867 mg AgBr.
 gefunden: 53,42% C; 5,54% H; 12,40% Br.
 ber. für C₂₁H₂₂O₆) Br. H₂O:
 53,73% C; 5,37% H; 17,04% Br.

Das wasserhaltige Bromid konnte durch wässrige Ammoniaklösung ebenfalls leicht in feine Carbinolbase, das μ -Oxypentamethylhaematoxylin zurückverwandelt werden. Dagegen gelang dies nicht mehr bei einer Probe des wasserhaltigen Bromids, das durch Erhitzen auf höhere Temperatur wasserfrei gemacht werden sollte, ein Zeichen dafür, daß dabei eine tiefergehende Zersetzung stattfindet.

c) μ -Oxypentamethylhaematoxylin-perchlorat:



0,5 g μ -Oxypentamethylhaematoxylin wurden in wenig heißem Alkohol gelöst und 2—3 Tropfen 70%iger wässriger Überchlorsäure hinzugefügt. Es schied sich fast augenblicklich ein Niederschlag von dunkelviolet gefärbten Nadelchen aus, der nach einigem Stehen abgefaugt und im Vakuum über Natronkalk getrocknet wurde.

- 10,290 mg des lufttrockenen Perchlorats ergaben 3,180 mg AgCl.
 gefunden: 7,64% Cl.
 ber. für C₂₁H₂₃O₆) ClO₄: 7,53% Cl.

Das Perchlorat erwies sich als viel hydrolysenbeständiger als das Chlorid und Bromid. Erst nach kurzem Erwärmen mit verdünnter wässriger Ammoniaklösung trat Entfärbung ein. Durch Umkristallisieren des so erhaltenen, fast farblosen Rohproduktes konnte das μ -Oxypentamethylhaematoxylin fast quantitativ wieder zurückerhalten werden.

*d) Tetramethylisohaemateinsulfat
(aus μ -Oxypentamethylhaematoxylin):*



0,5 g μ -Oxypentamethylhaematoxylin wurden solange mit 5 ccm conc. Schwefelsäure erwärmt, bis die zunächst tiefrote Lösungsfarbe in ein grünstichiges Gelb übergegangen war. Beim Verdünnen mit Eiswasser schied sich ein orangeroter Niederschlag ab, der aus wenig Eisessig umkristallisiert die typischen langen orangefarbenen Nadeln des Tetramethylisohaemateinsulfats bildete, die sich als identisch mit dem aus μ -Oxytetramethylhaematoxylin dargestellten Isohaemateinsulfat erwiesen.

9. Reduktionsversuche am μ -Oxypentamethylhaematoxylin:

*a) Reduktion zum Tetramethyldesoxyhaematoxylin
(1,2,10,11-Tetramethoxychromindan):*

2 g μ -Oxypentamethylhaematoxylin wurden in 30 ccm Eisessig¹⁾ gelöst und nach Zugabe von 0,5 g Pd/BaSO₄ bei Atmosphärendruck mit Wasserstoff geschüttelt. Nach 3 Stunden waren 125 ccm H₂ (entsprechend 1 Mol. H₂ auf 1 Mol. Substanz) aufgenommen. Die vom Katalysator abfiltrierte, dunkelgelb gefärbte Lösung wurde im Vakuumexsiccator über Natronkalk zur Trockne eingeeengt und der dunkel gefärbte, harzige Rückstand mit wenig Alkohol aufgenommen. Aus der alkoholischen Lösung schieden sich nach längerem Stehen neben großen Mengen harziger Produkte etwa 0,6 g farblose Kristallblättchen ab, die nach mehrmaligem Umlösen in Alkohol, den maximalen Schmelzpunkt 151° zeigten. Ein Mischschmelzpunkt mit Tetramethyldesoxyhaematoxylin sowie die Lösungsfarbe in conc. Schwefelsäure (schwach gelb mit fast farblosem Ablauf) zeigten, daß in dem Reduktionsprodukt der Desoxykörper vorlag.

1) Ein Hydrierungsversuch in alkoholischer Lösung zeigte, selbst nach 30stündigem Schütteln, nur eine geringfügige Wasserstoffaufnahme.

*b) Reduktion zum Tetramethylanhydrohaematoxylin
(1,2,10,11-Tetramethoxychrominden).*

α.) Zu 0,2 g μ -Oxypentamethylhaematoxylin, gelöst in 5 ccm heißem Alkohol, wurde eine conc. wässrige Lösung von 1 g Natriumhyposulfit ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$) gegeben und 2—3 Tropfen rauchender Salzsäure hinzugefügt. Nach einstündigem Kochen auf dem Wasserbad wurde das hellgelb gefärbte Reaktionsgemisch mit wässrigem Ammoniak verdünnt, und der nach längerem Stehen ausgefallene, fast farblose Niederschlag aus wenig heißem Alkohol umkristallisiert. Er bildete schwach bräunliche gefärbte Nadeln, die sich bei 170 bis 174° unter Braunfärbung zersetzten und sich in conc. Schwefelsäure mit orangegelber Farbe lösten. Durch den Mischschmelzpunkt mit dem Äthylenderivat der Reihe, dem Tetramethylanhydrohaematoxylin, wurde die Identität des Reduktionsproduktes mit dem Anhydrokörper sichergestellt.

β.) Eine Lösung von 0,5 g μ -Oxypentamethylhaematoxylin in 10 ccm Eisessig wurde tropfenweise mit 3 ccm conc. wässriger Salzsäure versetzt und dann mit einem großen Überschuß von Zinkstaub auf dem Wasserbad erwärmt. Die zunächst tiefröte Lösung färbte sich dabei langsam gelbbraun. Die vom überschüssigen Zinkstaub abgetrennte Lösung wurde mit der 10fachen Menge Wasser verdünnt, mit festem Natriumcarbonat neutralisiert und mehrere Male mit Äther ausgezogen. Die vereinigten ätherischen Auszüge hinterließen nach dem Verdampfen des Lösungsmittels dunkel gefärbte Kristallkrusten, die nach mehrfachem Umkristallisieren fast farblose Nadeln bildeten. Ihr Schmelzpunkt (171—175°) sowie ihre Lösungsfarbe in conc. Schwefelsäure (orangegelb) zeigten, daß das Reduktionsprodukt mit Tetramethylanhydrohaematoxylin identisch war. Ein Mischschmelzpunkt der Verbindung mit dem Äthylkörper ergab keine Depression.

III. Reduktionsprodukte der Tetramethyl- isohaematoxylinreihe.

Bei der Reduktion des Tetramethylhaematoxylons mit Magnesium und Eisessig entstehen neben dem α -Tetramethylisohaematoxylin das Tetramethylhaematoxylinol und das α -Tetramethylhaematoxylopinakon. Im folgenden soll zunächst das Reduktionsverfahren

beschrieben werden; dann werden das schon bekannte Tetramethylhaematoxylonol und das α -Tetramethylhaematoxylopinakon besprochen; im vierten Kapitel folgt dann die Beschreibung des wichtigsten Reduktionsproduktes, das α -Tetramethyl-isohaematoxylin und in einem fünften Abschnitt die Darstellung seines Isomerisierungsproduktes, des β -Tetramethyl-isohaematoxylin.


1. Reduktion des Tetramethylhaematoxylons mit Magnesium und Eisessig.¹⁾

Um die drei nebeneinander entstehenden Reduktionsprodukte in möglichst guter Ausbeute zu erhalten, wurde folgendes Verfahren ausgearbeitet:

15 g Tetramethylhaematoxylin wurden in einem Gemisch von 300 ccm Eisessig und 300 ccm Benzol unter Erwärmen gelöst und nach dem Abkühlen auf 30° 15 g Magnesiumspäne in kleinen Portionen unter kräftigem Rühren zugegeben. Gegen Ende des Versuchs (Dauer etwa acht Stunden) wurde mit etwas Wasser verdünnt, da das Reaktionsgemisch durch das ausgeschiedene Magnesiumacetat zu einem dicken Brei erstarrte. Sobald alles Magnesium in Lösung gegangen war, wurde mit der dreifachen Menge Wasser verdünnt und der im Laufe von 12 Stunden abgeschiedene, zum Teil kristalline Niederschlag abgetrennt (Rohprodukt I). Aus der im Filtrat befindlichen Benzolschicht hinterblieb nach dem Verdampfen des Lösungsmittels ein dunkel gefärbtes Öl, das mehrere Male mit wenig absolutem Äther ausgezogen wurde. Im Äther ungelöst blieb ein weißes amorphes Produkt (Rohprodukt II). Die vereinigten ätherischen Auszüge ergaben nach dem Verdampfen des Lösungsmittels einen dunkel gefärbten öligen Rückstand, dessen benzolische Lösung mehrmals mit 2n NaOH ausgezogen wurde. Die benzolische Schicht wurde mit Sodalösung und Wasser gewaschen, mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel auf dem Wasserbad entfernt. Es hinterblieb eine geringe Menge eines dunkelbraunen Öls, das in der Kälte langsam erstarrte (Rohprodukt III). Die alkalischen Auszüge ergaben nach dem Anfäuern mit verdünnter Salzsäure noch eine kleine Menge eines farblosen Niederschlages, der mit dem Rohprodukt I vereinigt wurde.


1) P. Pfeiffer und Mitarbeiter, B. 61, 1931 (1928).

2. Tetramethylhaematoxylonol (1,2,10,11-Tetramethoxy-lyo-chromindanon(6)-ol(5).



Das gut getrocknete Rohprodukt I wurde in wenig heißem absolutem Alkohol gelöst, aus dem sich beim Erkalten langsam große farblose Kristallnadeln abschieden, die nach zweimaligem Umlösen aus absolutem Alkohol den Schmelzpunkt 188° hatten. Die Lösungsfarbe dieser Substanz in conc. Schwefelsäure (rotviolett mit rein blauem Ablauf!), sowie der Mischschmelzpunkt mit auf andere Weise erhaltenen Tetramethylhaematoxylonol¹⁾, der keine Depression zeigte, erwiesen die Identität der beiden Verbindungen. Die Ausbeute an reiner Substanz betrug 10 g.

3. α -Tetramethylhaematoxylopinakon.



Beim Umkristallisieren des Rohproduktes II aus viel heißem Eisessig kristallisierte das Pinakon in feinen farblosen Blättchen, die sich bei 287° unter vorhergehender Braunfärbung zerletzten²⁾ und sich in conc. Schwefelsäure mit tannengrüner Farbe, die rasch in ein schmutziges Gelb überging, lösten. Ausbeute an analysenreiner Substanz: 3 g.

4,809 mg der bei 80° im Vakuum getrockneten Substanz ergaben: 11,320 mg CO_2 und 2,455 mg H_2O .

gefunden: 64,20% C; 5,71% H.
ber. für $\text{C}_{40}\text{H}_{42}\text{O}_{14}$: 64,34% C; 5,67% H.

Molekulargewichtsbestimmung nach Raft:

0,0098 g Substanz zeigten, in 0,3361 g Campher gelöst, eine Schmelzpunktserniedrigung $\Delta = 1,7^\circ$.

gefundenes Mol.Gew.: 807

ber. für $\text{C}_{40}\text{H}_{42}\text{O}_{14}$: 746.

1) Zum Vergleich stellte uns Herr Dr. P. Schneider in liebenswürdiger Weise Tetramethylhaematoxylonol zur Verfügung.

2) In der vorläufigen Mitteilung, B. 61, 1926 (1928), ist der Zerfetzungspunkt mit 283° angegeben.

a) Diacetyl-tetramethylhaematoxylopinakon :

1 g Tetramethylhaematoxylopinakon wurden in 10 ccm Essigsäureanhydrid gelöst und nach Zugabe von einem Überschuß an wasserfreiem Natriumacetat 4 Stunden zum gelinden Sieden erhitzt. Das Reaktionsgemisch wurde dann mit viel Wasser verdünnt und mehrmals mit Benzol ausgezogen. Die vereinigten benzolischen Auszüge hinterließen nach dem Verdampfen des Lösungsmittels eine fast farblose, zum Teil kristalline Masse, die aus heißem Eisessig umkristallisiert farblose glänzende Nadeln bildete. Diese lösten sich im Gegensatz zum Ausgangsprodukt, leicht in heißem Eisessig. Ihr maximaler Schmelzpunkt lag bei 291° , ein Mischschmelzpunkt mit dem freien Pinakon ergab eine deutliche Depression. Die Lösungsfarbe war die des Ausgangsproduktes. Die Analyse zeigte, daß ein Diacetylderivat vorlag, bewies also das Vorhandensein zweier alkoholischer Gruppen im Tetramethylhaematoxylopinakon:

4,623 mg Substanz ergaben 10,130 mg CO_2 und 2,220 mg H_2O	
gefunden:	63,34% C; 5,71% H,
ber. für $\text{C}_{40}\text{H}_{40}\text{O}_{14}(\text{COCH}_3)_2$:	63,59% C; 5,57% H.

b) Oxydation des Tetramethylhaematoxylopinakons :

Eine Lösung von 1 g Tetramethylhaematoxylopinakon in 15 ccm Eisessig wurde mit einer conc. wässrigen Lösung von 0,6 g Chromsäure versetzt und einige Minuten auf dem Wasserbad erwärmt. Aus der mit der 3—4fachen Menge Wasser verdünnten Lösung schied sich nach längerem Stehen ein gelbgefärbter kristalliner Niederschlag ab, der aus Eisessig in farblosen Nadeln vom Schmelzpunkt $192\text{—}196^{\circ}$ kristallisierte, die identisch mit dem Tetramethylhaematoxylopinakon waren.

4. α -Tetramethylisohaematoxylin.

$\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_6$, F: 196°

a) Darstellung und Eigenschaften.

Beim mehrfachen Umlösen des Rohproduktes III aus wenig wasserfreiem Methanol wurden farblose ineinander verfilzte Kristallnadelchen erhalten, deren maximaler Schmelzpunkt bei 196° lag ¹⁾;

¹⁾ In der vorläufigen Mitteilung, B. 61, 1932 (1928), ist er mit $188\text{—}192$ angegeben.

sie lösten sich in conc. Schwefelsäure mit blutroter Farbe und gleichem Ablauf. Die Ausbeute an diesem Reduktionsprodukt war sehr gering, etwa 1,5—2% des angewandten Ausgangsproduktes. Trotzdem die Versuchsbedingungen nach allen Seiten hin (Arbeiten in höherer und niedrigerer Konzentration, Variation des Lösungsmittels, Erhöhung der Reaktionstemperatur etc.) geändert wurden, gelang es nicht, die Reduktion im Sinne einer vermehrten Bildung dieser Verbindung zu leiten.

Die Analyse der bei 80° im Vakuum getrockneten Substanz zeigte folgende Werte:

4,661 mg Substanz ergaben 11,425 mg CO ₂ und 2,590 mg H ₂ O.	
gefunden:	66,87% C; 6,21% H,
ber. für C ₂₀ H ₂₂ O ₆ :	67,01% C; 6,19% H.

Im Gegensatz zu den früheren Angaben kristallisiert also die Verbindung wasserfrei.

b) Bestimmung des aktiven Wasserstoffs.

0,187 g Substanz, gelöst in 5,2 g Pyridin und 16,8 g Xylol ergaben bei 16,5° und 759 mm Druck:	21,60 ccm CH ₄
reduziert auf 0° und 760 mm Druck:	21,06 ccm CH ₄
Blindwert:	8,54 ccm CH ₄
Differenz:	12,54 ccm CH ₄

Berechnung des Blindwertes:

1 g Pyridin gab bei 0° und 760 mm Druck:	1,22 ccm CH ₄
1 g Xylol gab bei 0° und 760 mm Druck:	0,13 ccm CH ₄
Daraus berechnet sich der Blindwert zu:	8,54 ccm CH ₄
gefunden:	0,30% aktiver Wasserstoff
ber. für H: C ₂₀ H ₂₂ O ₆ :	0,28% aktiver Wasserstoff.

c) α-Tetramethyl-iso-haematoxylin-perchlorat:

Einige mg des α-Tetramethyl-iso-haematoxylin wurden in wenigen Tropfen 70%iger Überchlorsäure gelöst. Nach längerem Stehen im Vakuum über Natronkalk schieden sich aus der tiefrot gefärbten Flüssigkeit dunkelrote lange Nadeln des Perchlorats ab, die sehr beständig gegen Wasser waren. Beim Behandeln mit verdünnter Ammoniaklösung wurden sie momentan farblos und lösten sich

in conc. Schwefelsäure mit grünbrauner, in der Durchsicht weinroter Farbe.

*d) Oxydation mit Chromsäure, Tetramethyl-oxo-
isohaematoxylin :*



0,5 g α -Tetramethyl-iso-haematoxylin wurden in 5 ccm Eisessig gelöst und tropfenweise unter Eiskühlung mit einer conc. wäßrigen Lösung von 0,25 g Chromsäure versetzt. Nach einigem Stehen wurde mit viel Wasser verdünnt und die im Laufe von 12 Stunden abgeschiedenen Kristallnadelchen abfiltriert. Aus wenig Alkohol bildete das Oxydationsprodukt farblose Kristallnadeln vom Schmelzpunkt 172°, die sich in conc. Schwefelsäure mit blutroter Farbe und etwas braunflichem Ablauf lösten. Die Mischschmelzpunkte mit dem Ausgangsprodukt, sowie mit Tetramethylhaematoxylin ergaben eine deutliche Depression. Die Analysen der bei 80° im Vakuum getrockneten Substanz stimmten gut auf die Summenformel: $\text{C}_{20}\text{H}_{20}\text{O}_7$.

1) 4,742 mg ergaben 11,240 mg CO_2 und 2,370 mg H_2O ,

2) 4,590 mg ergaben 10,805 mg CO_2 und 2,240 mg H_2O ,

3) 4,618 mg ergaben 10,865 mg CO_2 und 2,210 mg H_2O

gefunden:

1) 64,64% C, 5,59% H,

2) 64,20% C, 5,46% H;

3) 64,17% C, 5,35% H

ber. für $\text{C}_{20}\text{H}_{20}\text{O}_7$:

64,51% C; 5,41% H.

Wenige mg Tetramethyl-oxo-iso-haematoxylin wurden in wenig Essigsäureanhydrid gelöst und die Lösung nach Zugabe von etwas wasserfreiem Natriumacetat 4 Stunden zum Sieden erhitzt. Nach dem Entfernen des überschüssigen Anhydrids durch mehrmaliges Abdampfen mit wasserfreiem Methanol wurde der Rückstand mit Wasser aufgenommen, das Ungelöste abfiltriert, getrocknet und aus Alkohol umkristallisiert. Das Reaktionsprodukt bildete, in allerdings sehr geringer Menge, lange farblose Nadeln vom Schmelzpunkt 188—189°, die mit dem Ausgangsprodukt eine deutliche Depression ergaben. Die Lösungsfarbe in conc. Schwefelsäure war intensiv blaugrün, zeigte jedoch eine geringe Beständigkeit, und ging rasch in weinrot über.

Eine alkoholische Lösung von einigen mg Tetramethyl-oxo-iso-haematoxylin wurde, nach Zugabe etwa der gleichen Menge salzsauren Hydroxylamins mehrere Stunden auf dem Wasserbad zum Sieden erhitzt. Der beim Verdünnen mit Wasser ausgefallene Niederschlag ergab nach dem Trocknen und Umkrystallisieren aus wenig Alkohol das Ausgangsprodukt zurück. Ein entsprechender Versuch mit salzsaurem Semicarbazid war ebenfalls erfolglos.

Das sehr resistente Verhalten von Tetramethyl-oxo-iso-haematoxylin gegenüber Alkali (selbst nach 5stündigem Kochen mit einer conc. alkoholischen Kaliumhydroxydlösung wurde das unveränderte Ausgangsprodukt zurückerhalten) läßt die Vermutung, daß es sich beim Tetramethyl-oxo-iso-haematoxylin um ein Lacton handeln könne, als sehr unwahrscheinlich erscheinen, da sich ein solches durch Alkalien leicht zur entsprechenden Oxy Säure verseifen ließe.

e) Acetylierungsversuche.

0,5 g α -Tetramethyl-iso-haematoxylin wurden mit 5 ccm Essigsäureanhydrid und wasserfreiem Natriumacetat längere Zeit zum Sieden erhitzt. Die Aufarbeitung ergab das Ausgangsprodukt (F: 196°) zurück. Weitere Acetylierungsversuche mit Acetylchlorid und Thioessigsäure blieben ebenfalls erfolglos.

5. β -Tetramethyl-iso-haematoxylin :

$C_{20}H_{22}O_6$, F: 163°.

a) Darstellung.

0,3 g α -Tetramethyl-iso-haematoxylin wurden in wenig wasserfreiem Benzol gelöst und die Lösung nach Zugabe der dreifachen Gewichtsmenge Phosphorpentoxyd 2 Stunden auf dem Wasserbad zum Sieden erhitzt. Die Lösung wurde vom Rückstand abgesehen und dieser mehrmals mit wenig heißem Benzol ausgezogen. Die vereinigten benzolischen Lösungen hinterließen nach dem Verdampfen des Lösungsmittels ein fast farbloses Öl, das mit wenig Methanol aufgenommen wurde. Aus der methylalkoholischen Lösung schieden sich nach kurzer Zeit farblose Kristalle ab, die nach weiterem zweimaligem Reinigen den maximalen Schmelzpunkt von 163° zeigten. Die Lösungsfarbe war die des Ausgangsproduktes, ein Mischschmelzpunkt mit der α -Form zeigte eine starke Depression.

Die Analyse der bei 80° im Vakuum getrockneten Substanz stimmte auf die Zusammenfassung: $C_{20}H_{22}O_6$:

5,108 mg Substanz gaben: 12,510 mg CO_2 und 2,750 mg H_2O	
gefunden:	66,89% C; 6,03% H
ber. für $C_{20}H_{22}O_6$:	67,01% C; 6,19% H.

b) Acetyl-, β -tetramethyl-isoaematoxylin:



0,05 g β -Tetramethyl-isoaematoxylin wurden in wenig Eisigsäureanhydrid mit einem Überschuß von wasserfreiem Natriumacetat 3 Stunden zum Sieden erhitzt. Nach dem Entfernen des unverbrauchten Anhydrids durch mehrmaliges Abdampfen mit wasserfreiem Methanol wurde der gut getrocknete Rückstand mit wasserfreiem Aceton aufgenommen, das Ungelöste abfiltriert und die Lösung zur Trockne verdampft. Der Rückstand bildete aus Alkohol kleine farblose Nadeln vom Schmelzpunkt 144°, die mit dem Ausgangsprodukt eine starke Depression zeigten. Die Analyse der bei 80° im Vakuum getrockneten Substanz stimmte auf ein Monoacetylderivat der Formel $C_{20}H_{21}O_6(CO \cdot CH_3)$:

4,987 mg gaben 12,040 CO_2 und 2,750 mg H_2O	
gefunden:	65,86% C; 6,17% H,
ber. für $C_{22}H_{24}O_7$:	65,96% C; 6,04% H.

0,02 g des Acetylderivates wurden in wenig Alkohol gelöst und die Lösung mit einigen Tropfen alkoholischer Kalilauge kurz aufgeköcht. Beim Anfäuern mit verdünnter Salzsäure fiel ein weißer Niederschlag aus, der abfiltriert, getrocknet und aus wenig Alkohol umkristallisiert farblose Nadeln vom Schmelzpunkt 163° bildete, die identisch mit dem β -Tetramethyl-isoaematoxylin waren.

c) β -Tetramethyl-isoaematoxylin-perchlorat:

Eine conc. Lösung von wenigen mg β -Tetramethylisoaematoxylin in Eisessig wurde mit 2 Tropfen Überchlorsäure versetzt. Nach längerem Stehen im Vakuum über Natronkalk schieden sich aus der tiefrot gefärbten Lösung die tiefroten langen Nadeln des Perchlorats ab. Gegen Wasser ist das Salz sehr beständig, es wird aber beim Behandeln mit verdünntem Ammoniak momentan farblos, ohne daß die Kristallform sich ändert,

d) Versuch zur Umlagerung in die α -Form :

Eine alkoholische Kaliumhydroxydlösung wurde mit wenigen mg β -Tetramethyl-isothaematoxylin veretzt und dann längere Zeit auf dem Wasserbad erwärmt. Die Aufarbeitung ergab unverändertes β -Tetramethyl-isothaematoxylin zurück.

*e) Oxydation mit Chromsäure,
Tetramethyl-oxo-isothaematoxylin :*

0,5 g β -Tetramethyl-isothaematoxylin wurden in 5 ccm Eisessig gelöst und unter guter Kühlung mit einer conc. wäßrigen Lösung von 0,25 g Chromsäure veretzt. Nach längerem Stehen wurde mit Wasser verdünnt, mit Äther mehrmals ausgezogen und die vereinigten ätherischen Lösungen nach dem Trocknen eingedampft. Der Rückstand bildete aus wenig Methanol farblose Nadeln vom Schmelzpunkt 172° , die sich in conc. Schwefelsäure mit blutroter Farbe und einem etwas gelbstichigen Ablauf lösten. Ein Mischschmelzpunkt mit dem Oxydationsprodukt der α -Verbindung, dem Tetramethyl-oxo-isothaematoxylin, zeigte keine Depression.

IV. Reduktionsprodukte der Tetramethyl-allothaematoxylinreihe.

1. β -Tetramethyl-allothaematoxylin (1,2,10,11-Tetramethoxy-(5,6)-oxido-lychrodindan.



a) Darstellung :

6 g Tetramethylhaematoxylin wurden in 200 ccm Eisessig und 200 ccm Alkohol unter Erwärmen gelöst. Nachdem sich die Lösung auf etwa 60° abgekühlt hatte, wurden unter kräftigem Rühren 300 g 3-prozentiges Natriumamalgam in kleinen Portionen zugegeben. Während der ganzen Versuchsdauer (ca. 7 Stunden) wurde die Temperatur auf etwa 60° gehalten. Nach beendeter Reaktion wurde die Lösung vom abgeschiedenen Quecksilber abgesehen und auf etwa ein Drittel ihres Volumens eingengt. Die noch heiße Lösung wurde nun vorsichtig mit einer konzentrierten Sodaaflösung neutralisiert. Dabei schied sich ein gelbbraun gefärbtes Öl ab, das beim Abkühlen erstarrte und sich so leicht von der Lösung trennen

ließ. Nach mehrfacher Reinigung des Konproduktes durch Umkristallisation aus wenig absolutem Alkohol bildete das β -Tetramethyl-allohaematoxylin farblose große Kristalle vom Schmelzpunkt 150° , die sich in conc. Schwefelsäure blutrot mit gleichem Ablauf lösten. Ausbeute: 2,8 g.

Die Analyse der bei 80° im Vakuum getrockneten Substanz zeigte folgende Werte:

4,978 mg Substanz gaben 12,175 mg CO_2 und 2,740 mg H_2O . gefunden:	66,71% C und 6,16% H
ber. für $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_6$:	67,01% C und 6,19% H.

Aus der vom Öl abgetrennten wäßrigen Lösung schied sich nach längerem Stehen ein hellgefärbter amorpher Niederschlag ab, der jedoch nicht weiter untersucht wurde. Er bestand in der Hauptsache aus Tetramethylhaematoxylonol, das an anderer Stelle näher beschrieben ist.

b) Konstitutionsermittlungsversuche:

Bestimmung des aktiven Wasserstoffs.

1. Bestimmung:

0,1142 g Substanz, gelöst in 5,4 g Pyridin und	
10,95 g Xylol ergaben bei $11,5^{\circ}$ und 750 mm:	8,60 ccm CH_4
reduziert auf 0° und 760 mm:	8,11 ccm CH_4
Blindwert:	6,00 ccm CH_4
Differenz:	2,11 ccm CH_4

Bestimmung des Blindwerts:

1 g Pyridin gab bei 0° und 760 mm Druck:	1,05 ccm CH_4
1 g Xylol gab bei 0° und 760 mm Druck:	0,03 ccm CH_4
Daraus berechnet sich der Blindwert zu:	6,00 ccm CH_4
gefunden:	0,08% aktiver Wasserstoff
berechnet für 1 akt. H-Atom:	0,28% aktiver Wasserstoff.

2. Bestimmung:

0,0726 g Substanz, gelöst in 4,2 g Pyridin und	
9,45 g Xylol, ergaben bei 10° und 769 mm:	6,20 ccm CH_4
reduziert auf 0° und 760 mm:	6,01 ccm CH_4
Blindwert:	4,70 ccm CH_4
Differenz:	1,31 ccm CH_4

Bestimmung des Blindwertes:

1 g Pyridin gab bei 0° und 760 mm Druck: 1,054 ccm CH₄

1 g Xylol gab bei 0° und 760 mm Druck: 0,03 ccm CH₄

Daraus berechnet sich der Blindwert zu: 4,70 ccm CH₄

gefunden: 0,08% aktiver Wasserstoff,

berechnet für 1 akt. H-Atom: 0,28% aktiver Wasserstoff.

Die beiden übereinstimmenden Werte lassen darauf schließen, daß das β -Tetramethyl-allohaematoxylin kein aktives Wasserstoffatom besitzt.

Verfuche zur Acetylierung:

0,5 g der β -Verbindung wurden in 10 ccm Essigsäureanhydrid gelöst und nach Zugabe von 1 g wasserfreiem Natriumacetat 1 Stunde am Rückflußkühler erhitzt. Nach mehrmaligem Abdampfen des Reaktionsgemisches mit wasserfreiem Methanol wurde der trockene eisessigsaure Rückstand mehrmals mit Aceton ausgezogen, die vereinigten Auszüge eingedampft und der Rückstand aus Alkohol umkristallisiert. Die hierbei erhaltenen farblosen Kristalle schmolzen bei 150° und erwiesen sich durch Mischschmelzpunkt und Lösungsfarbe in conc. H₂SO₄ als identisch mit dem Ausgangsprodukt. Der gleiche Versuch wurde mit 6— bzw. 18stündigem Kochen wiederholt. Beide Ansätze ergaben fast quantitativ das Ausgangsprodukt zurück.

0,5 g der β -Verbindung wurden in möglichst wenig wasserfreiem Pyridin gelöst und mit 3 ccm Essigsäureanhydrid versetzt. Nach 3-tägigem Stehen wurde das Pyridin im Vakuum entfernt, der Rückstand mit wasserfreiem Methanol bis zur völligen Entfernung des Essigsäureanhydrids behandelt, mit Aceton ausgezogen und nach dem Verdampfen des Lösungsmittels aus Alkohol umkristallisiert. Auch hier wurde fast quantitativ das Ausgangsprodukt wiedererhalten. Eine Wiederholung des Versuchs bei Wasserbadtemperatur blieb ebenfalls erfolglos.

Versuch zur Oximierung:

0,150 g der β -Verbindung wurden in wenig absolutem Alkohol gelöst und nach Zugabe von 100 mg wasserfreiem Natriumacetat und 100 mg Hydroxylaminhydrochlorid 6 Stunden auf dem Wasser-

bad erhitzt. Der beim Verdünnen mit Wasser ausgefallene kristalline Niederschlag zeigte nach einmaligem Umkristallisieren aus Alkohol einen Schmelzpunkt von 150° . Mischschmelzpunkt und Lösungsfarbe in conc. Schwefelsäure erwiesen die Identität mit dem Ausgangsprodukt.

Verhalten gegen Alkali:


0,1 g der β -Verbindung wurden in wenig absolutem Alkohol gelöst und nach Zugabe von 5 ccm 2 n Natronlauge 2 Stunden erwärmt. Das Reaktionsgemisch wurde mit verdünnter HCl neutralisiert und der ausgefallene kristalline Niederschlag einmal aus Alkohol umkristallisiert. Farblose Kristalle des Ausgangsproduktes vom Schmelzpunkt 150° .

Oxydationsversuche:

1 g der β -Verbindung wurde in wenig Eisessig aufgeschlämmt und unter Eiskühlung mit einer conc. wässrigen Lösung von 0,6 g Chromsäure veretzt. Nach längerem Stehen wurde mit Wasser verdünnt und der ausgefallene schwach gelbliche Niederschlag aus Alkohol umgelöst. Er erwies sich als identisch mit dem Ausgangsprodukt. Der gleiche Ansatz wurde 1 Stunde lang auf dem Wasserbad erwärmt. Die Aufarbeitung ergab ein gelbgefärbtes amorphes Produkt, das sich in Alkali leicht löste, aber nicht kristallin zu erhalten war. Lösungsfarbe in conc. Schwefelsäure: zunächst orange-gelb, dann rasche Verfärbung in ein schmutziges Braun.

Eine Lösung von 500 mg der β -Verbindung in 10 ccm Alkohol wurde mit 10 ccm Perhydroi längere Zeit auf dem Wasserbad erwärmt. Nach dem Aufarbeiten konnte quantitativ das Ausgangsprodukt zurückerhalten werden.

2. α -Tetramethyl-allohaematoxylin.



a) Darstellung.

Zu einer Lösung von 1 g β -Tetramethyl-allohaematoxylin in 10 ccm wasserfreiem Benzol wurde die dreifache Gewichtsmenge Phosphorpentoxyd gegeben und das Ganze längere Zeit auf dem Wasserbad erwärmt. Die noch heiße Lösung wurde vom Rückstand abgesehen und dieser mehrmals mit wenig heißem Benzol ausge-

zogen. Die vereinigten Filtrate wurden auf dem Wasserbad zur Trockne verdampft und im Vakuum über Paraffin gut getrocknet, um alle Spuren des Lösungsmittels zu entfernen. Ausbeute an Rohprodukt: 1 g. Das Reaktionsprodukt kristallisierte aus Anisol in feinen farblosen Nadeln vom Schmelzpunkt 165—166°, und gab mit dem Ausgangsprodukt eine starke Depression. Lösungsfarbe in conc. Schwefelsäure: blutrot mit gleichem Ablauf.

5,088 mg bei 80° im Hochvakuum getrockneter Substanz ergaben 1,500 mg CO₂ und 2,810 mg H₂O.

gefunden: 67,00% C und 6,17% H

berechnet für C₂₀H₂₂O₆: 67,01% C und 6,19% H.

b) Versuche zur Konstitutionsermittlung:

Oxydationsversuche:

0,1 g α -Tetramethyl-allohaematoxylin wurden in wenig Eisessig gelöst und unter Eiskühlung mit einer conc. wässrigen Lösung von 0,1 g Chromsäure veretzt. Nach 12stündigem Stehen wurde mit Wasser verdünnt. Der langsam gebildete Niederschlag ergab nach dem Umkristallisieren aus Anisol die farblosen Nadeln des Ausgangsproduktes zurück. Bei einem weiteren Oxydationsversuch bei Wasserbadtemperatur entstand ein alkalilösliches amorphes Produkt, an dem alle Kristallisationsversuche scheiterten. Ebenso blieben die Oxydationsversuche mit Perhydrol, sowohl in der Kälte wie in der Wärme erfolglos. In beiden Fällen wurde das Ausgangsprodukt zurückerhalten.


Acetylierungsversuche:

Alle Acetylierungsversuche am α -Tetramethylallohaematoxylin, mit Essigsäureanhydrid, mit Acetylchlorid und mit Thioessigsäure, waren erfolglos. In allen Fällen konnte das Ausgangsprodukt in mehr oder weniger guter Ausbeute zurückgewonnen werden.

Versuch zur Umlagerung in die β -Form:

Alle Umlagerungsversuche, Kochen mit verdünnten Säuren oder mit Alkohol, blieben erfolglos. Die α -Form ist demnach als die stabilere anzusehen.

c) *Additionsverbindung mit Aethylalkohol:*



0,6 g α -Tetramethyl-allohaematoxylin wurden in wenig abfolutem Alkohol gelöst. Beim Erkalten fchieden fch feine farblose Nadelchen ab, die felbst nach mehrmaligem Umlöfen aus Alkohol keinen fcharfen Schmelzpunkt zeigten, fondern fch bei $125-132^\circ$ unter Auffchäumen zerfetzten. Löfungsfarbe in conc. Schwefelfäure: blutrot. Die lufttrocken analyfierte Verbindung zeigte folgende Werte:

4,684 mg Subftanz ergaben:	11,249 mg CO_2 und 2,700 mg H_2O
gefunden:	65,98% C; 6,49% H,
ber. für 2 $(\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_6) \cdot \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$:	66,14% C; 6,61% H.

Gewichtsverlustbeftimmung:

0,1207 g verloren bei 80° und 12 mm bis zur Gewichtskonftanz getrocknet, 0,0072 g.

gefunden: 5,96% Gewichtsverlust,

berechnet für den Verl. von $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

aus $2(\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_6) \cdot \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$: 6,04% Gewichtsverlust.

d) *Additionsverbindung mit Benzol:*



0,5 g α -Tetramethyl-allohaematoxylin wurden in wenig heißem Benzol gelöst. Beim langfamen Verdunften des Löfungsmittels im Vakuum fchieden fch feine farblose Nadelchen ab, die ebenfalls keinen fcharfen Schmelzpunkt zeigten und fch bei $132-138^\circ$ unter Gasentwicklung zerfetzten. Die Halochromie mit conc. Schwefelfäure war die des Ausgangsproduktes.

Gewichtsverlustbeftimmung:

0,0245 g der lufttrockenen Verbindung verloren beim Trocknen bei 80° und 12 mm insgefamt 0,0010 g an Gewicht

gefunden: 4,29% Gewichtsverlust

berechnet für den Verlust von

C_6H_6 aus $5(\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_6) \cdot \text{C}_6\text{H}_6$: 4,18% Gewichtsverlust

Beide Additionsverbindungen ergaben beim Trocknen bis zur Gewichtskonftanz denfelben kristallinen Rückftand, der einen ziemlich fcharfen Schmelzpunkt von $158-160^\circ$ hatte und vor allem

beim Schmelzen keine Gasentwicklung mehr zeigte. Ein Schmelzpunkt mit dem aus Anisol gewonnenen α -Tetramethyl-allohaematoxylin lag bei $164-166^{\circ}$.

Eine CH-Bestimmung des bis zur Gewichtskonstanz getrockneten Alkoholadditionsproduktes ergab:

0,040 mg gaben 12,330 mg CO_2 und 2,830 mg H_2O	
gefunden:	66,72% C, 6,28% H
berechnet für $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_6$:	67,01% C, 6,19% H.

Die Analysenwerte, sowie der Schmelzpunkt des Erhitzungsproduktes zeigen, daß es sich bei ihm um die α -Form des Tetramethyl-allohaematoxylics handelt, die höchstens noch Spuren des Addenten enthält. Das analysierte Produkt zeigte schon nach einmaligem Umkristallisieren aus Anisol den scharfen Schmelzpunkt von 166° .

Im Laufe der vorliegenden Untersuchungen wurden ferner die Additionsprodukte des α -Tetramethyl-allohaematoxylics mit Chloroform, Äther, Aceton und Pyridin dargestellt, aber nicht näher untersucht. Sie bilden alle farblose Nadeln, deren Zersetzungspunkte innerhalb von $125-135^{\circ}$ liegen.

V. Zusammenstellung der Strukturisomeren des Tetramethylhaematoxylin:

Bruttoformel: $C_{20}H_{20}O_6$.

N a m e	Schmelzpunkt	H ₂ SO ₄ -Reaktion	SnCl ₄ -Reaktion	HClO ₄ -Reaktion	aktive Wasserstoffatome	Oxydation mit Chromsäure	Reaktion mit Essigsäureanhydrid
Tetramethylhaematoxylin (6-Oxy, 1,2,10,11-tetramethoxychromindan)	142°	orangegelb mit fast farblosem Ablauf; nachkelnd.	orangegelber Niederschlag in Benzol. Wasserempfindlich.	Hellrote Lösung. Mit NH ₃ wird das Ausgangsprodukt zurückerhalten.	1	Tetramethylhaematoxylon $C_{20}H_{20}O_7$, F. 192—196° Halochromie: gelb-orange	Tetramethyl-acetylhaematoxylin, F. 178—180°
α -Tetramethyl-allohaematoxylin (1,2,10,11-Tetramethoxy-5,6-oxido-lyochromindan)	166°	blutrot mit gleichem Ablauf; beständig.	violetter Niederschlag in Benzol. Wasserempfindlich.	Blutrote Lösung. Mit NH ₃ wird das Ausgangsprodukt zurückerhalten.	0	Alkalilösliches amorphes Produkt. Nicht kristallin.	Keine Einwirkung
β -Tetramethyl-allohaematoxylin (1,2,10,11-Tetramethoxy-5,6-oxido-lyochromindan)	150°	blutrot mit gleichem Ablauf; beständig.	violetter Niederschlag in Benzol. Wasserempfindlich.	Blutrote Lösung. Mit NH ₃ wird das Ausgangsprodukt zurückerhalten.	0	Alkalilösliches amorphes Produkt. Nicht kristallin.	Keine Einwirkung
α -Tetramethyl-iso-haematoxylin	196°	blutrot mit gleichem Ablauf; beständig.	violetter Niederschlag in Benzol. Wasserempfindlich.	Tiefrote Kristalle mit schwarzgrünen Oberflächen-glanz. Werden mit NH ₃ sofort farblos.	1	Tetramethyl-oxo-iso-haematoxylin Halochromie: blutrot $C_{20}H_{20}O_7$, F. 172°	Keine Einwirkung
β -Tetramethyl-iso-haematoxylin	163°	blutrot mit gleichem Ablauf; beständig.	violetter Niederschlag in Benzol. Wasserempfindlich.	Tiefrote Kristalle mit schwarzgrünen Oberflächen-glanz. Werden mit NH ₃ sofort farblos.	1	Tetramethyl-oxo-iso-haematoxylin Halochromie: blutrot $C_{20}H_{20}O_7$, F. 172°	β -Tetramethyl-acetyl-iso-haematoxylin $C_{22}H_{24}O_7$, F. 144°

Verzeichnis

r von P. Pfeiffer und Mitarbeitern veröffentlichten Arbeiten:
zur Frage des Bafilins und Haematoxylyns“.

1. B. 50, 911 (1917).
2. B. 53, 945 (1920).
3. B. 57, 208 (1924).
4. B. 58, 197 (1925).
5. B. 60, 2142 (1927).
6. B. 61, 294 (1928).
7. B. 61, 839 (1928).
8. B. 61, 1923 (1928).
9. B. 62, 1242 (1929).
10. B. 63, 1301 (1930).
11. J. pr. 129, 31 (1931).
12. J. pr. 137, 227 (1933).
13. J. pr. 139, 69 (1933).
14. J. pr. 140, 9 (1934).

Lebenslauf.

Am 22. Mai 1911 wurde ich, Heinz Ulrich Werner, in Heidenheim (Brenz) als Sohn des Betriebsdirektors Friedrich Werner und seiner Ehefrau, Anne geb. Helbling geboren. Ich bin Reichsdeutscher, evangelischer Konfession, und arischer Abstammung.

Von Herbst 1917 bis Ostern 1929 besuchte ich die Elementarschule und das Realgymnasium in Heidenheim, das ich Ostern 1929 mit dem Zeugnis der Reife verließ. Vom SS. 1929 bis zum SS. 1930 studierte ich an der Universität Tübingen zunächst das höhere Lehrfach mit den Fächern Chemie, Physik und Geologie, ging dann aber im WS. 1930/31 zum reinen Chemiestudium über. Seit SS. 1931 studierte ich an der Universität Bonn, wo ich im Februar 1932 das 1., im Juli 1933 das 2. chemische Verbandsexamen ablegte. Im Herbst 1933 begann ich unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Dr. Dr. ing. E. h. P. Pfeiffer die vorliegende Arbeit, die im Herbst 1935 beendet wurde. Im SS. 1934 war ich Hilfsassistent in der anorganisch-analytischen Abteilung des Chemischen Instituts, seit Oktober 1934 bin ich Assistent im Privatlaboratorium von Herrn Professor Dr. Dr. ing. E. h. P. Pfeiffer. Tag der mündlichen Doktorprüfung 18. Dezember 1935.
